

VYDATE® 10L

Nematocida

LIQUIDO CONCENTRATO SOLUBILE IN ACQUA

Meccanismo d'azione: 1A (IRAC)

Composizione di VYDATE 10L

Oxamyl puro g 10 (100 g/L)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene Tartrazina



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H300: Letale se ingerito. **H331:** Tossico se inalato. **H411:** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH208:** Contiene tartrazina, può provocare una reazione allergica. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare i vapori. **P270:** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P301+P310:** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P304+P340:** IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P321:** Trattamento specifico (vedere le informazioni di pronto soccorso su questa etichetta). **P330:** Sciacquare la bocca. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P403+P233:** Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona - Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscienze France S.A.S – Cernay – Francia

Sinteco Logistics SpA – San Giuliano Milanese (MI) – Italia
(solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 5- 10 Litri

Registrazione n. 11611 del 20.02.2003 del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI

Conservare soltanto nel recipiente originale. Evitare l'esposizione-procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miopia, lacrimazione, scialorea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

TERAPIA: atropina. **CONTROINDICAZIONI:** ossime.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia; se e' interessata anche la testa lavare anche i capelli.

In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze:

- solo se la persona è cosciente
- entro 30 minuti dall'ingestione
- se non presenta crisi convulsive

Consultare Un Centro Antiveneni

MODALITA' DI IMPIEGO

VYDATE 10L è un nematocida in formulazione di liquido concentrato solubile in acqua contenente il 10% di principio attivo Oxamyl dotato d'azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto. VYDATE 10L risulta efficace contro nematodi galligeni (*Meloidogyne* spp.) e cistiformi (*Globodera* ed *Heterodera* spp.). VYDATE 10L disciolto nell'acqua di irrigazione, deve essere distribuito nel terreno mediante impianti a goccia. Si consiglia la diluizione e la distribuzione del prodotto in acqua irrigua acidificata ad un valore di pH prossimo a 4,5 allo scopo di migliorarne l'assorbimento e la disponibilità per l'apparato radicale.

VYDATE 10L non si distribuisce mediante irrorazione fogliare, ma solo attraverso impianti a goccia e può essere utilizzato solo in ambiente protetto (serre o tunnels) ad eccezione del tabacco sul quale il prodotto si applica solo in pieno campo e solo attraverso impianti a goccia completamente incorporati nel suolo e posti ad una profondità massima di 5 cm.

Non applicare su colture idroponiche o comunque in assenza di suolo.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

POMODORO – MELANZANA: VYDATE 10L si applica subito dopo il trapianto ad un dosaggio di 10-20 l/ha. Trascorsi 10-14 giorni dal primo intervento effettuare altre tre applicazioni alla dose di 10 l/ha e a distanza di 10-14 giorni una dall'altra. Utilizzare il dosaggio piu' alto e l'intervallo piu' breve in caso di elevata pressione del parassita.

Su pomodoro e melanzana non superare le 4 applicazioni ed i complessivi 50 l/ha di formulato per ciclo colturale.

PEPERONE: VYDATE 10L si applica subito dopo il trapianto ad un dosaggio di 10-20 l/ha. Trascorsi 10-14 giorni dal primo intervento effettuare altre due applicazioni alla dose di 10 l/ha e a distanza di 10-14 giorni una dall'altra. Utilizzare il dosaggio piu' alto e l'intervallo piu' breve in caso di elevata pressione del parassita.

Su peperone non superare le 3 applicazioni ed i complessivi 40 l/ha di formulato per ciclo colturale.

CETRIOLO - ZUCCHINO - MELONE - COCOMERO: VYDATE 10L si applica subito dopo il trapianto ad un dosaggio di 10-20 l/ha. Trascorsi 10-14 giorni dal primo intervento effettuare un'altra applicazione alla dose di 10 l/ha. Utilizzare il dosaggio piu' alto e l'intervallo piu' breve in caso di elevata pressione del parassita.

Su cetriolo, zucchini, melone e cocomero non superare le 2 applicazioni ed i complessivi 30 l/ha di formulato per ciclo colturale.

TABACCO (in pieno campo): VYDATE 10L si applica subito dopo la fase di trapianto della coltura ad un dosaggio di 10-20 l/ha, preferendo la dose piu' alta in caso di elevata pressione del parassita. Trascorsi dai 10 ai 14 giorni dopo il trapianto effettuare altri due interventi alla dose di 10 l/ha distanziati 10-14 giorni uno dall'altro, per un massimo di 3 applicazioni e di complessivi 40 l/ha di formulato per anno. In ogni caso tra la terza applicazione e l'inizio della raccolta dovranno trascorrere almeno 35 giorni.

COMPATIBILITA': VYDATE 10L va distribuito da solo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: VYDATE 10L è selettivo nei confronti delle piu' comuni cultivar attualmente presenti sul mercato; in caso di introduzione di nuove varietà si consiglia comunque di effettuare tests di selettività su scala ridotta. Sebbene non siano noti casi di resistenza ad Oxamyl, allo scopo di evitare l'insorgenza di popolazioni di nematodi con ridotta sensibilità al prodotto, VYDATE 10L deve essere applicato in accordo con la presente etichetta ed in alternanza con altri formulati nematocidi caratterizzati da differente meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta per pomodoro e melanzana, 35 giorni prima per il peperone ed il tabacco, 50 giorni prima per cetriolo, zucchini, melone e cocomero.

ATTENZIONE: durante le fasi di caricamento/miscelazione del prodotto utilizzare indumenti protettivi completi, guanti di gomma, occhiali di protezione e respiratore con filtro per vapori organici ed evitare la presenza di personale estraneo non dotato di dispositivi di protezione individuale: per lavorazioni nelle aree trattate entro le 24 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi completi, guanti di gomma ed occhiali di protezione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderli sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare:

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)

Per **EMERGENZE durante il trasporto** contattare: 0039-333 2107947 (24H)

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti** contattare: 0039 0372 709900 (O.U.)

Etichetta autorizzata con D.D. del 05/09/2022 con validità dal 01/10/2022