



PROTEZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA

Linea pomodoro da industria

Fungicidi antiperonosporici


Prodotto	Composizione	Avversità	Dose ad ettaro	N. max di tratt./anno	Int. sic. gg.	Gruppo FRAC
 Biocupro®	Rame metallo (sotto forma di poltiglia bordolese) 124 g/L	Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i>), alternaria (<i>Alternaria porri</i>), batteriosi (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)	4,0-6,0 L/ha	8	3	M1
Chantico®	Cyazofamid puro 100 g/L	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8 L/ha	6	3	21
Curzate®	Cimoxanil puro 20 g	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,78 kg/ha	4	3	27
Curzate® 60 WG	Cimoxanil puro 60 g	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,26 kg/ha	4	3	27
NOVITÀ Curzate® ERRE EVO	Cimoxanil puro 4 g Rame metallo 20 g (da Poltiglia bordolese)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	2,8-3,0 kg/ha	6	10	27, M1
Curzate® R WG	Cimoxanil puro 4,2 g Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) 39,75 g	Peronospora, alternaria e septoria, attività collaterale anche contro batteriosi	1,8-2 kg/ha	7	10	27, M1
Curzate® System	Cimoxanil puro 4 g Fosetil Alluminio puro 60 g	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 kg/ha	3	20	P7, 27
Zorvec™ Enicade® NTec	Zorvec™ Enicade®: Oxathiapiprolin 100 g/L Gachinko®: Amisulbron puro 200 g/L	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,15 L/ha + 0,6 L/ha	3	3	49, 21
NOVITÀ Zorvec™ Epicaltrin® C	Zorvec™ Epicaltrin®: Oxathiapiprolin 100 g/L Azuleo®: Cyazofamid puro 160 g/L	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,15 L/ha + 0,5 L/ha	3	3	49, 21

Biocupro®: titolare registrazione Manica S.p.A. - Chantico®: titolare registrazione Diachem S.p.A. - Curzate® R WG: titolare registrazione Isagro S.p.A. - Curzate® System: titolare registrazione Scam S.p.A. - Gachinko®: titolare registrazione PHILAGRO France - Azuleo®: titolare registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Fungicidi

Prodotto	Composizione	Avversità	Dose ad ettaro	N. max di tratt./anno	Int. sic. gg.	Gruppo FRAC
Fontelis®	Penthiopyrad puro 200 g/L	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>) e sclerotinia (<i>Sclerotinia spp.</i>)	2,4 L/ha	1	3	7
Lidal®	Tetraconazolo puro 40 g/L	Oidio e cladosporiosi	Oidio: 1-1,25 L/ha Cladosporiosi: 1,25-1,875 L/ha	2 - 3	3	3
 Thiamon® Flow	Zolfo puro 800 g/L (esente da selenio)	Oidio	2 L/ha	6	3	M2
NOVITÀ Vertiaro®	Difenoconazolo puro 250 g/L	<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Lev-eillula taurica</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp</i>	0,4-0,5 L/ha	3	7	3

Lidal®: titolare registrazione Isagro S.p.A. - Thiamon® Flow: titolare registrazione DIACHEM S.p.A. - Vertiaro®: titolare registrazione Syngenta Italia S.p.A.



Erbicidi

Prodotto	Composizione	Avversità	Dose ad ettaro	N. max di tratt./anno	Int. sic. gg.	Gruppo HRAC
Executive®	Rimsulfuron p.a. puro 25 g	Infestanti graminacee sensibili: avena selvatica (<i>Avena spp.</i>), sanguinella (<i>Digitaria spp.</i>), giavone (<i>Echinochloa spp.</i>), panico delle risaie (<i>Panicum dichotomiflorum</i>), panico coltivato (<i>Panicum miliaceum</i>), scagliola (<i>Phalaris spp.</i>), panicastrella (<i>Setaria spp.</i>), sorghetta (<i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum halepense</i> da seme e da rizoma). Infestanti a foglia larga sensibili: cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>), amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>), ambrosia (<i>Ambrosia spp.</i>), visnaga maggiore (<i>Ammi majus</i>), forbicine (<i>Bidens bipinnata</i>), borsa del pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>), vilucchio bianco (<i>Calystegia sepium</i>), rucola violacea (<i>Diploaxis spp.</i>), fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>), galinsoga (<i>Galinsoga parviflora</i>), topinanbur (<i>Helianthus tuberosus</i>), camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), menta campestre (<i>Mentha arvensis</i>), Orobanche spp., aspraggine comune (<i>Picris echioides</i>), ranuncolo (<i>Ranunculus spp.</i>), miagro peloso (<i>Rapistrum rugosum</i>), senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>), crespino (<i>Sonchus spp.</i>) e nappola (<i>Xanthium spp.</i>)	50-60 g/ha + bagnante Codacide® 1,25 L/ha	2 (3 solo su orobanche)	30	B
Executive® Gold						
Exoset® 240 EC	Clethodim puro 25,2 g	Avena selvatica (<i>Avena sp.</i>), forasacco (<i>Bromus sp.</i>), ricacci di cereali, sanguinella (<i>Digitaria sp.</i>), giavone (<i>Echinochloa sp.</i>), Leptochloa sp., loglio (<i>Lolium sp.</i>), riso (<i>Oryza sp.</i>), falso panico (<i>Panicum sp.</i>), falaride (<i>Phalaris sp.</i>), fienarola (<i>Poa sp.</i>), setaria (<i>Setaria sp.</i>), gramigna (<i>Agropyron sp.</i>), panico acquatico (<i>Paspalum distichum</i>), gramigna comune (<i>Cynodon dactylon</i>), sorghetta (<i>Sorghum halepense</i>)	1,5 L/ha + bagnante Codacide® 1,25 L/ha	1	30	A
Mesozin® 70 WG	Metribuzin puro 70 g	Ampio spettro	Pre-semina e pre-trapianto: 0,25-0,30 kg/ha Post-emergenza e post-trapianto: 0,25-0,4 kg/ha	1	30	C1

Exoset® 240 EC: titolare registrazione Arysta Lifescience S.A.S. - Mesozin® 70 WG: titolare della registrazione Adama deutschland GMBH



Insetticidi

Prodotto	Composizione	Avversità	Dose ad ettaro	N. max di tratt./anno	Int. sic. gg.	Gruppo IRAC
Closer™	Sulfoxaflor puro 11,9%	Afidi	200 ml/ha	2	1	4C
 Delfin®	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Berliner var. Kurstaki</i> 6,4 g	Nottue, tignola del pomodoro	0,5-1,5 Kg/ha	6	-	11A
Exalt™ 25 SC	Spinetoram puro 3% (25 g/L) - Nome commerciale JEMVELVA™ active	Nottue, <i>T. absoluta</i> , <i>F. occidentalis</i>	2,4 L/ha	2	3	5
 GreenPY® 2 EC PRO	Piretrine puro 18.61 g/L	Tripidi, mosca bianca.	1,92 L/ha 160 ml/hl Fino a 1200 L/ha	3	1	3A
Intrepid™	Metossifenozone puro 22,5 g	Nottua mediterranea e nottua gialla del pomodoro	400-500 ml/ha	1	3	18
Kempo Sorbie®	Lambda-cialotrina puro 5 g	Afidi, tripidi, nottue defogliatrici, piralidi	150-300 g/ha	2	3	3A
 Laser™	Spinosad puro 44,2 g	Nottua mediterranea (<i>Spodoptera littoralis</i>) e nottua gialla del pomodoro (<i>Heliothis armigera</i>)	20-25 ml/hl	3	3	5
		Piralide del mais (<i>Ostrinia Nubilalis</i>)	15-20 ml/hl			
		Tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	20 ml/hl			
		Fillominatrice del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>)	20-25 ml/hl			
Sword® UP	Etofenprox 30 g	Tignole (<i>T. absoluta</i> , ecc), nottue (<i>Spodoptera spp.</i> , <i>H. armigera</i>), miridi (<i>Calocoris spp.</i> , <i>Lygus spp.</i>), cimici (<i>N. viridula</i> , <i>P. prasinata</i>), tripidi ed aleurodidi	500 ml/ha	1	3	3A

Delfin®: titolare registrazione Mitsui Agriscience International S.A./N.V. - Kempo Sorbie®: titolare della registrazione NUFARM ITALIA Srl - Sword® UP: titolare registrazione Sipcam Italia S.p.A. - GreenPY® 2 EC PRO: titolare registrazione Copyr S.p.A

Attecchimento delle
giovani piantine

Accrescimento
vegetativo

Fioritura ed
allegagione

Sviluppo
dei frutti

Maturità
fisiologica
e raccolta



Strategia per il controllo di Lepidotteri e Tripidi

Exalt™ 25 SC 2,4 L/ha

2 applicazioni/anno a 2,4 L/ha ciascuna.
L'eventuale secondo trattamento deve essere ripetuto ad intervalli minimi di
28 giorni in pieno campo

Integrare la strategia con le altre soluzioni Corteva a seconda delle esigenze specifiche

Strategia di difesa Afidi:



Inizio infestazione

Closer™ 0,2 L/ha

Se necessario



Closer™ 0,2 L/ha