
ORONDIS VEG®

Antiperonosporico per impieghi su pomodoro, melanzana e lattughe.
Dispersione oleosa

Meccanismo d'azione: Gruppo 49 (FRAC)

ORONDIS VEG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Oxathiapiprolin g 10,1 (= 100 g/L)
Coformulanti q.b. a 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Indossare guanti protettivi (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352), In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione e Confezionamento
-Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
-Phyteurop – Z.I. Grande Champagne Montreuil Bellay, France
-Corteva Agriscience LLC. – Valdosta Manufacturing Center, 2509 Rocky Ford Road – Valdosta, GA 31061, USA
Officina di sola ri-etichettatura:
Sinteco Logistics – S. Giuliano Milanese (MI)
Registrazione n°17462 del 03/09/2019 del Ministero della Salute
Distribuito da: **Syngenta Italia SpA, Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano – Tel. 02-334441**
Contenuto netto:
Litri 0.1-0.12-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.45-0.6-0.9-1 1.2 PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Indossare guanti protettivi e tuta da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto.
-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico o un centro antiveleni.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15-20 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
ORONDIS VEG è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora di alcune colture orticole: pomodoro, melanzana e lattughe.
Il prodotto è dotato di movimento translaminare nelle foglie trattate e di sistemia xilematica.
ORONDIS VEG deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
POMODORO e MELANZANA: per il controllo di peronospora (*Phytophthora infestans*) **in pieno campo e in serra** applicare **0.2 l/ha** di ORONDIS VEG avendo cura di bagnare bene la vegetazione. Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare la dose di 20 ml/hl fino ad un massimo di **0.3 l/ha.**
ORONDIS VEG, impiegato in miscela con altri antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, puo' essere usato al dosaggio di **0.12 l/ha.** Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare 12 ml/hl fino ad un massimo di **0.18 l/ha**.
Effettuare un massimo di 3 applicazioni per anno rispettando un intervallo di 7-10 giorni. Rispettare l'intervallo piu' breve in caso di alta pressione della malattia.
LATTUGHE: per il controllo di peronospora (*Bremia lactucae*) **in pieno campo** applicare **0.15 l/ha** di ORONDIS VEG avendo cura di bagnare bene la vegetazione.
Effettuare un massimo di 2 applicazioni per ciclo colturale per un totale massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7-10 giorni. Rispettare l'intervallo piu' breve in caso di alta pressione della malattia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa meta' della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità necessaria di ORONDIS VEG direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Mantenere l'agitatore in funzione durante tutto il trattamento. Non usare agitatori ad aria. Applicate immediatamente dopo la preparazione della soluzione.
Quando usato in miscela si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio secondo la sequenza:
- sacchetti idrosolubili
- granuli idrosolubili (SG)
- granuli dispersibili (WG)
- polveri bagnabili (WP)
- sospensione concentrata (SC)
- suspoemulsioni (SE)
- dispersioni oleose (OD)
- emulsioni acquose (EW)
- emulsioni concentrate (EC)
- concentrati solubili in acqua (SL)
- fertilizzanti

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE DELLE RESISTENZE: ORONDIS VEG contiene la sostanza attiva oxathiapiprolin che appartiene al gruppo 49 del FRAC. Le seguenti restrizioni dovranno essere considerate quando si applica ORONDIS VEG o qualunque altro fungicida contenente una sostanza attiva appartenente al gruppo FRAC 49:
-Si consiglia di effettuare un numero di trattamenti con ORONDIS VEG non superiore ad un terzo del numero totale di applicazioni con prodotti fitosanitari ad azione antiperonosporica.
-Il prodotto deve essere applicato preventivamente e non più di 3 volte in sequenza; in caso di necessità di ulteriori trattamenti occorre intervenire con un fungicida avente un diverso meccanismo d'azione.
-Eventuali fungicidi applicati dopo i trattamenti effettuati con ORONDIS VEG dovrebbero preferibilmente avere attività curativa.
-Si consiglia di non superare le complessive 6 applicazioni per anno con prodotti contenenti oxathiapiprolin sullo stesso appezzamento e dirette contro il medesimo patogeno.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di applicazioni su nuove varietà.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
ORONDIS VEG deve essere applicato su vegetazione asciutta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti **3 giorni** prima della raccolta di pomodoro e melanzana, **7 giorni** prima della raccolta delle lattughe.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03.09.2019 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01.10.2021.