ORONDIS®

Antiperonosporico per la vite (da vino e da tavola)
Dispersione oleosa

Meccanismo d'azione: Gruppo 49 (FRAC)

ORONDIS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Oxathiapiprolin g 10,1 (= 100 g/L)
Coformulanti q.b. a 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Indossare guanti protettivi (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352), In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione e Confezionamento
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Phyteurop – Z.I. Grande Champagne Montreuil Bellay, France
Corteva Agriscience LLC, 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA), 31601
Officina di sola ri-etichettatura:
Sinteco Logistics – S. Giuliano Milanese (MI)
Registrazione n° 17461 del 03/09/2019 del Ministero della Salute
Distribuito da: Syngenta Italia SpA, Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano – Tel. 02-334441
Contenuto netto: 0,2-0.25-0,3-0,4-0,6-0,8-1-1,2 L PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Indossare guanti protettivi e tuta da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto.
-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico o un centro antiveleni.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15-20 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
ORONDIS è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite. Il prodotto è dotato di movimento translaminare nelle foglie trattate e di sistemia xilematica.
ORONDIS deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE (da vino e da tavola): per il controllo di Peronospora (*Plasmopara viticola)* applicare 0.4 l/ha di ORONDIS avendo cura di bagnare bene la vegetazione. Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare la dose di 40 ml/hl fino ad un massimo di **0.6 l/ha.**
ORONDIS, impiegato in miscela con altri antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, puo' essere usato ad un dosaggio di 0.2 l/ha. Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare la dose di 20 ml/hl fino ad un massimo di **0.3 l/ha**.
Effettuare un massimo di 2 applicazioni per anno ad un intervallo di 10-14 giorni. Rispettare l'intervallo piu' breve in caso di alta pressione della malattia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa meta' della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità necessaria di ORONDIS direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Mantenere l'agitatore in funzione durante tutto il trattamento. Non usare agitatori ad aria. Applicate immediatamente dopo la preparazione della soluzione. Quando usato in miscela si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio secondo la sequenza:
- sacchetti idrosolubili
- granuli idrosolubili (SG)
- granuli dispersibili (WG)
- polveri bagnabili (WP)
- sospensione concentrata (SC)
- suspoemulsioni (SE)
- dispersioni oleose (OD)
- emulsioni acquose (EW)
- emulsioni concentrate (EC)
- concentrati solubili in acqua (SL)
- fertilizzanti

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE DELLE RESISTENZE
ORONDIS contiene la sostanza attiva oxathiapiprolin che appartiene al gruppo 49 del FRAC.
Le seguenti restrizioni dovranno essere considerate quando si applica ORONDIS o qualunque altro fungicida contenente una sostanza attiva appartenente al gruppo FRAC 49:
-Applicare ORONDIS (o qualunque altro formulato contenente una sostanza attiva appartenente al Gruppo 49 FRAC) preventivamente e non più di 2 volte per stagione.
-Si consiglia di effettuare un numero di trattamenti con ORONDIS non superiore ad un terzo del numero totale di applicazioni con prodotti fitosanitari ad azione antiperonosporica.
-Eventuali fungicidi applicati dopo i trattamenti effettuati con ORONDIS dovrebbero avere un meccanismo d'azione differente e preferibilmente essere dotati di attività curativa.
-Non applicare il prodotto in vivai per la produzione di barbatelle.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In caso di miscela con prodotti a base di folpet sospendere i trattamenti dalla fase di allegagione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
ORONDIS deve essere applicato su vegetazione asciutta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03.09.2019 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01.10.2021.