TIOVIT L®

Antioidico a base di Zolfo in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro micronizzato g 55,7 (= 800 g/L)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A.
Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna
Sede operativa: Tel. 0545 992455

Registrazione n.17069 del 06/10/2017 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
S.T.I. –Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA)
Tel. 0545 992455

Distribuito da: Syngenta Italia S.p.A. – Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO Tel. 02 334441–

Contenuto netto: ml 500; litri 1, 3, 5, 10, 20 Partita n°:..

Prescrizioni supplementari:
Durante le operazioni di miscelazione e caricamento, applicazione e attività di mantenimento, utilizzare indumenti da lavoro.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per applicazioni su vite rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e delle strade.

Per applicazioni su Pomodoro: Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m dalla zona non coltivata o in alternativa rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3-5 m dalla zona non coltivata in associazione ad ugelli che riducano la deriva del 50%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere consultare un medico o un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: TIOVIT L è un particolare formulato a base di zolfo ad azione antioidica per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono le colture.

Le sue favorevoli caratteristiche presentano i seguenti vantaggi: elevata selettività nei confronti delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia.

Epoche, dosi e modalità di impiego (riferite a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volumi normali).

VITE: contro oidio (*Erisiphe necator*)
Prima applicazione a partire dalla quinta foglia sviluppata alla dose di 4 litri /ha in 500-1000 litri di acqua/ha. Effettuare fino ad un massimo di 8 trattamenti al momento della fioritura e ad acini ben formati da luglio in poi, intervallando gli interventi con una frequenza di 7 giorni.

Pomodoro, contro Mal Bianco (*Leveillula* spp.) :
Prima applicazione da cotiledoni completamente dispiegati alla dose di 2 l/ha in 400-1500 litri di acqua/ha ripetendo i trattamenti fino ad un massimo di 6 a distanza di 10 giorni.

Cereali (frumento, orzo, segale, avena, triticale) contro Mal bianco (*Blumeria graminis*):
Prima applicazione a partire dalla comparsa della prima foglia alla dose di 10 l/ha in 150-300 litri di acqua/ha. Effettuare un massimo di 2 interventi distanziati di 14 giorni.

Floreali e Ornamentali: trattamenti contro Oidio (*Sphaerotheca pannosa*), prima applicazione a partire dalla comparsa della prima foglia alla dose di 3 l/ha in 450-1500 litri di acqua/ha, effettuando un massimo di 5 trattamenti a cadenza di 10 giorni. Su Rosa intervenire fino allo stadio di bottone verde.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare **TIOVIT** L ad altri fungicidi.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali e con Captano.

FITOTOSSICITA' : si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattamenti su larga scala.

AVVERTENZE: il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto su vite, 3 giorni prima del raccolto su pomodoro e 35 giorni prima del raccolto sui cereali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio Registrato Syngenta

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 novembre 2021

TIOVIT L®

Antioidico a base di Zolfo in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro micronizzato g 55,7 (= 800 g/L)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A
Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna
Sede operativa: Tel. 0545 992455

Registrazione n.17069 del 06/10/2017 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
S.T.I. –Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA)
Tel. 0545 992455

Distribuito da: Syngenta Italia S.p.A. – Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO Tel. 02 334441–

Contenuto netto: ml 500; Partita n°:..

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Marchio Registrato Syngenta

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 novembre 2021