

**BELLIS®**

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO AUTORIZZATO SU POMACEE

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto
contengono:
25,2 g
di *Boscalid* e
12,8 g
di *F500®*
(*Pyraclostrobin*)

**FORMULAZIONE**

Granuli
idrodispersibili (WG)

**CLASSIFICAZIONE**

ATTENZIONE

**REG. MIN. SALUTE**

N° 12868
del 13-07-2006

**CONFEZIONE**1
Kg flacone**IMBALLO**

Cartone
- da 10 flaconi

Caratteristiche

BELLIS® è la soluzione contro le principali avversità fungine delle **Pomacee** come **Maculatura bruna**, **Oidio** e **Ticchiolatura** contro funghi emergenti, di sempre crescente importanza, come l'**Alternaria del Melo**. **BELLIS®** fornisce, inoltre, un contributo notevole per il controllo delle malattie fungine che si sviluppano in post-raccolta, come **Marciume lenticellare** e **Marciume verde-azzurro**, diminuendo gli scarti di frutta in magazzino.

Modalità d'uso

Grazie al suo doppio meccanismo d'azione che agisce sulla respirazione del fungo, il prodotto garantisce un'intrinseca strategia antiresistenza contro i funghi bersaglio. **BELLIS®** è un prodotto preventivo. Si consiglia di impiegarlo nelle fasi e nelle condizioni più favorevoli agli attacchi fungini, intervenendo ogni 8-14 giorni in relazione alla pressione di malattia e 7-14 giorni per le malattie da conservazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.500 l/ha (es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella da intendersi come minime. Con volumi superiori a 1.500 l/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi. Coerentemente con le linee guida fissate a livello internazionale dal FRAC, il comitato che si occupa di prevenire il rischio d'insorgenza di patogeni resistenti ai fungicidi, si consiglia di utilizzare **BELLIS®**:

- su **Melo** per un massimo di 3 trattamenti a stagione;
- su **Pero**, in una strategia di alternanza con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in blocchi di massimo 2 trattamenti consecutivi.

Avvertenze

Per favorire la miglior dispersione del prodotto in soluzione acquosa riempire metà serbatoio con acqua e mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria. Continuare ad agitare la soluzione ed aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (g/hl)	DOSE (Kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N°MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
MELO	Alternaria del Melo Oidio, Ticchiolatura	55	0,8	Intervenire nel periodo di maggior sensibilità del patogeno	3	7
PERO	Maculatura bruna Ticchiolatura	55	0,8	Intervenire nel periodo di maggior sensibilità del patogeno	3	7
PERO E MELO	Malattie da conservazione	55	0,8	Intervenire nel periodo di maggior sensibilità del patogeno	3*	7

* Trattamenti eseguiti in campo, prima della raccolta