

MIKONOS®

Fungicida sistemico per l'impiego su vite, arancio, pompelmo e olivo
Liquido solubile (SL)

Meccanismo d'azione: FRAC P 07

MIKONOS - Registrazione Ministero della Salute n. 18001 del 02/03/2022

Composizione

100g di prodotto contengono:

Fosfonato di potassio

g. 54,5 (=790 g/L)

corrispondente a 35,2 g (=510 g/L) di acido fosfonico

Coformulanti q.b. a

g. 100,00

Partita n.

® Marchio registrato SIPCAM OXON SpA

LAINCO S.A.

Avda. Bizet, 8-12 - Pol. Ind. Can Jordi
08191 Rubí (Barcellona) - Spagna
Tel. +34 93.586.20.15

Stabilimento di produzione:

LAINCO S.A.

Avda. Bizet 8-12 (Pol. Ind. Can Jordi)
08191 Rubí (Barcellona) - Spagna

SIPCAM OXON S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO) - Italia

Distribuito da:
Sipcam Italia SpA
Via Sempione, 195
20016 Pero (MI)

Contenuto Netto: 100-250-500 mL; 1-5-10-20-50 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

CONSIGLI DI PRUDENZA: P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare tuta completa e guanti durante le operazioni di miscelazione, e carico ed applicazione del prodotto. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

MIKONOS è un fungicida sistemico e di contatto per l'impiego su vite, arancio, pompelmo e olivo per il controllo della peronospora e di altre malattie fungine.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) iniziare i trattamenti, quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal termine dello sviluppo delle foglie (BBCH > 20) e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino in prossimità della raccolta.

Dosi di impiego: 0,75-2,5 L/ha, corrispondenti a 250 ml/hL di prodotto distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 L/ha.

Numero massimo di trattamenti consentiti per anno: 3

Arancio e pompelmo: contro Peronospora (*Phytophthora spp.*) iniziare i trattamenti, quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal termine di accrescimento dei germogli (BBCH > 40), e proseguirli ad intervalli di 20 giorni fino in prossimità della raccolta.

Dosi di impiego: 1,5-7,5 L/ha, corrispondenti a 150-250 ml/hL di prodotto distribuiti con volumi d'acqua di 1000-3500 L/ha.

Numero massimo di trattamenti consentiti per anno: 2

Olivo: contro Occhio di pavone (*Cycloconium oleaginum*) effettuare un trattamento in inverno e due trattamenti in primavera distanziati di 10 giorni. Iniziare i trattamenti a partire dal termine dello sviluppo delle prime foglie (BBCH > 20).

Dosi di impiego: 1,2-2,5 L/ha, corrispondenti a 150-250 ml/hL di prodotto distribuiti con volumi d'acqua di 800-1000 L/ha.

Numero massimo di trattamenti consentiti per anno: 3

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto è stabile per 2 anni.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE, ARANCIO, POMPELMO E OLIVO.**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MIKONOS®

Fungicida sistemico per l'impiego su vite, arancio, pompelmo e olivo
Liquido solubile (SL)
Meccanismo d'azione: FRAC P 07

MIKONOS - Registrazione Ministero della Salute n. 18001 del 02/03/2022

Fosfonato di potassio g. 54,5 (=790 g/L)
Coformulanti q. b. a g. 100

® Marchio registrato SIPCAM OXON SpA

LAINCO S.A.

Avda. Bizet, 8-12
Poligono Industrial Can Jordi
E 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna
Tel. +34 93.586.20.15

Distribuito da:

Sipcam Italia SpA
Via Sempione, 195
20016 Pero (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

CONSIGLI DI PRUDENZA: P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimento di produzione:

LAINCO S.A.

Avda. Bizet, 8-12 - E 08191 Rubi (Barcellona) – Spagna

Contenuto netto: 100 mL

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**