



CYTHRIN MAX

CYTHRIN MAX è un insetticida in emulsione concentrata a base di cipermetrina. Controlla un largo numero di parassiti delle colture arboree ed erbacee. È un insetticida non sistemico che agisce per contatto ed ingestione.

COMPOSIZIONE Cipermetrina pura g 47,46 (500 g/L)

FORMULAZIONE Emulsione concentrata

INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg per frumento, orzo, segale, triticale, avena, farro; fino a completa fioritura per mais; 21 gg per colza, senape, cotone e vite; 14 gg per barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola rossa, rutabaga, rapa e tabacco; 7 gg per erba medica; 3 gg per tutte le altre colture ad esclusione di pioppo, olivo (piante non in produzione), ornamentali e forestali per i quali non è previsto un intervallo di sicurezza.

N° DI REGISTRAZIONE 14232 del 05.10.2011

CONFEZIONE L 0,5

INDICAZIONI DI PERICOLO H226 - H304 - H315 - H318
H332 - H335 - H336
H410 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/ha)
 Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena, Farro	Afidi vettori della BYDV, Afidi, Nottua delle Messi (<i>Agrotis segetum</i>), Tortricide (<i>Cnephasia spp.</i>), Lema (<i>Oulema spp.</i>) Criocera (<i>Crioceris spp.</i>)	50
 Mais da foraggio e da granella	Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Sesamia (<i>Sesamia cretica</i>), Nottua gialla (<i>Heliothis armigera</i>), Nottua delle messi (<i>Agrotis segetum</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica spp.</i>)	150
 Colza (invernale e primaverile), Senape	Altica (<i>Psylliodes chrysocephala</i> , <i>Phyllotreta atra</i>), Punteruolo (<i>Ceuthorrhynchus napi</i>), Cecidomia delle silique (<i>Dasyneura brassicae</i>), Meligete del colza (<i>Meligethes aeneus</i>), Cetonella pelosa (<i>Tropinata hirta</i>)	50
 Cotone	Nottuidi terricoli (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Pectinophora gossypiella</i> , <i>Earias insulana</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>), Afidi, Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tripide del tabacco (<i>Thrips tabaci</i>)	100
 Broccoli, Cavolfiori, Cavoli a testa	Altica (<i>Phyllotreta spp.</i>) e Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Afidi (<i>Myzus spp.</i> e <i>Aphis spp.</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica spp.</i>), Cicaline (<i>Empoasca spp.</i>), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.)	100
 Piselli e Fagioli freschi	Tripidi, Sitona (<i>Sitona lineatus</i>), Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.)	100
 Asparago	Criocera dell'asparago (<i>Crioceris asparagi</i>)	100
 Carciofo	Afidi, Nottue del carciofo (<i>Gortyna xanthenes</i> - <i>G. flavago</i>)	100
 Cipolla, Scalogno, Aglio	Nottuidi terricoli e fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.), Tignola del porro (<i>Acrolepiopsis assectella</i>), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus spp.</i> e <i>Aphis spp.</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica spp.</i>), Cicaline (<i>Empoasca spp.</i>), Tripidi, Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	100
 Melone, Zucche, Cocomeri ed altre Cucurbitacee a buccia non edibile		
 Pomodoro e Melanzana		
 Barbabietola da zucchero e da Foraggio, Bietola rossa, Rutabaga e Rapa	Cleono (<i>Conorrhynchus mendicus</i>) e Lisso (<i>Lixus junci</i>), Afidi (<i>Myzus spp.</i> e <i>Aphis spp.</i>), Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Cassida (<i>Cassida vittata</i>), Nottuidi terricoli e fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Trichoplusia sp.</i> , <i>Euxoa ochrogaster</i> , <i>E. scadens</i> , <i>E. tessellata</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i>)	100

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/ha)
 Carote, Sedano Rapa, Ravanelli, Scorzonera, Rafano, Pastinaca, Radici di Prezzemolo	Nottuidi terricoli e fogliari, (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , <i>Pieris spp.</i> , <i>Plutella spp.</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Autographa spp.</i> , <i>Agrotis segetum</i> , etc.), Altica (<i>Phyllotreta spp.</i>) e Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus spp.</i> and <i>Aphis spp.</i>), Cicaline (<i>Empoasca spp.</i>), Tripidi, Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	100
 Patata	Afidi (<i>Myzus spp.</i> and <i>Aphis spp.</i>), Tignola della patata (<i>Phthorimaea operculella</i>), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	80 - 100
 Vite da vino e da tavola	Tignole della vite (<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecillia ambiguella</i>), Tortricidi (<i>Sparganothis pilleriana</i>), Sigaraio della vite (<i>Byctiscus betulae</i>), Cicalina (<i>Scaphoides titanus</i>), Cicalina verde (<i>Empoasca vitis</i>)	60
 Olivo (piante non in produzione)	Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>) (generazione antofaga e carpofaga), Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>), Tignola verde (<i>Palpita unionalis</i>)	8-10 mL/hL Dose massima:100
 Erba Medica	Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Crisomelide nero (<i>Colaspidea atrum</i>), Punteruolo (<i>Phytonomus variabilis</i>), Afidi (<i>Myzus spp</i> and <i>Aphis spp.</i>), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Pratyedra gossypiella</i> , <i>Earias insulana</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	100
 Tabacco	Cassida (<i>Cassida vittata</i>), Afidi (<i>Myzus spp</i> and <i>Aphis spp</i>), Mosca Bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari (<i>Heliothisarmigera</i> , <i>Trichoplusia spp</i> , <i>Euxoa ochrogaster</i> , <i>E. scadens</i> , <i>E.tessellata</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Phthorimaea operculella</i>)	100
 Floreali, Ornamentali	Afidi, Tortrice mediterranea (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>) e Bega del Garofano (<i>Epichoristodes acerbella</i>), Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Nottuidi terricoli e fogliari	10-20 mL/hL Dose massima:100
 Pioppo in vivaio e giovani impianti	Afidi, Saperda (<i>Saperda carcharias</i>) e Criptorinco (<i>Cryptorhynchus lapathi</i>)	10 mL/hL Dose massima:100
 Forestali in vivaio	Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	4 mL/hL Dose massima:100

- Potente e immediata azione abbattente
- Contiene un'alta concentrazione di principio attivo
- La bassissima dose per ettaro lo rende particolarmente adatto al trattamento di grandi superfici
- Attivo contro larve, neanidi ed adulti

