

**AUDACE® SC****Insetticida in sospensione concentrata  
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 3A****COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.****CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.****PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.****P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.****REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.****CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.****SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.****TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

DIACHEM S.P.A.

Via Tonale 15

ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

**OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO**

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

**OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO E/O RI-ETICHETTATURA:**

STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Via E. Torricelli 2 - 48033 Cotignola (RA)

Althaller Italia S.r.l., Strada Com.le per Campagna 5 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)

**OFFICINA DI RI-ETICHETTATURA:**

Arco Logistica S.r.l. Via Antonio Battistella 22 - 44123 Ferrara (FE)

**DISTRIBUITO DA**

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Registrazione Ministero della Salute n. 17951 del 13/01/2022

**QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 1-5-10-30-50-60-100-150-200-250-500 litri 1-1,5-2-3-3,2-4,5-4,8 5-10****PARTITA N.**

© Audace è un marchio FMC Corporation o di sue società affiliate

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI****Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per la protezione degli organismi acquatici applicare le misure previste alla voce "Avvertenza". Il prodotto è nocivo per api e insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.****INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni****allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveneni****CARATTERISTICHE**

AUDACE® SC è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**

Le dosi riportate in ml/hl si riferiscono a trattamenti a "volume normale": per trattamenti a basso o ultra-basso volume aumentare proporzionalmente le dosi, per garantire la stessa quantità di prodotto ad ha. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse.

Numero massimo di trattamenti ed intervallo d'intervento (salvo diversa indicazione per singola coltura): N. 3 ogni 7-14 giorni.

AUDACE® SC si impiega alle dosi indicate sulle seguenti colture e contro i seguenti fitofagi:

**AGRUMI** (1 solo trattamento): contro Afidi e Mosca degli agrumi, Aleurodidi, Cocciniglie: 70-87 ml/hl.**FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino):** su Ciliegio e Susino 3 trattamenti ogni 14 giorni:

- contro neanidi di Cocciniglia S. Josè in trattamenti estivi, Psilla, Cidia e Anarsia: 90 ml/hl.

- contro Carpocapsa: 60 ml/hl.

- contro Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minatori di melo e pero, Anonomo, Maggiolini, Tentredine: 60-90 ml/hl.

- contro Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi e Mosca della frutta: 70-90 ml/hl.

- contro *Aromia bungii* di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino: 60-90 ml/hl. In interventi localizzati al tronco: 200 ml/hl.- contro *Drosophila suzukii* di ciliegio: 80 ml/hl.- contro *Bactrocera dorsalis*: 80 ml/hl- contro *Halyomorpha halys*: 80 ml/hl**MANDORLO** (3 trattamenti ogni 14 giorni): - contro Afidi (*Myzus p.*, *Hyalopterus pruni*), Cidia e Anonomo (*Anthonomus amygdali*): 70-87 ml/hl.**VITE:** contro Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide, *Popillia japonica*: 70-90 ml/hl.**OLIVO (da olio e da tavola):** contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide: 80-90 ml/hl (Olivo da Olio 3 trattamenti ogni 14 giorni)**ORTAGGI in campo (e serra dove specificato):****- CARCIOFO, CAVOLI A INFIORESCENZA (broccoli e cavolfiori), C. CAPPUCCIO, CETRIOLO (in campo ed in serra), FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA (in campo ed in serra), LATTUGHE E INSALATE (escluso scarola/indivia a foglie larghe e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), MELANZANA (in campo ed in serra), PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO (in serra), PEPERONE, RUCOLA, FOGLIE DI SEDANO, ZUCCHINO (in campo ed in serra), ZUCCA (in campo ed in serra):** 3 trattamenti ogni 7-14 giorni;**- C. DI BRUXELLES** massimo 2 trattamenti ogni 7 giorni;**- CAROTA, POMODORO (in campo), MELONE, CIPOLLA, AGLIO:** 3 trattamenti ogni 14 giorni;**- ASPARAGO (solo interventi post raccolta):** massimo 2 trattamenti ogni 7-14 giorni;

- contro Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi: 60-70 ml/hl;

- contro Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette: 80-90 ml/hl.

**FRUMENTO** (3 trattamenti ogni 14 giorni), **ORZO, MAIS:** contro Piralide, Diabrotica del mais, *Popillia japonica* di mais, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi: 0,6-0,8 l/ha.**COTONE (solo uso tessile):** contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus: 0,6 l/ha.**ERBA MEDICA:** contro Nottue, Misurino: 0,6 l/ha; contro le Cavallette: 0,8 l/ha**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** (1 solo trattamento): - contro Altica, Nottue e Mamestra: 0,6 l/ha;

- contro Lisso e Cleono: 0,8 l/ha.

**TABACCO:** contro Afidi, Tripidi, Nottue, Pulce (Epitrix): 0,6-0,8 l/ha.**PIOPPO:** - in vivaio contro Tarlo vespa e Gemmaiola: 90 ml/hl; in interventi localizzati al tronco contro Criptorinco: 150 ml/hl; - in interventi localizzati al tronco contro *Megaplatus mutatus* 150 ml/hl.- in pieno campo contro Crisomelidi defogliatori: 60-90 ml/hl; contro Criptorinco ed in interventi localizzati al tronco: 150-200 ml/hl; - in interventi localizzati al tronco contro *Megaplatus mutatus* 150-200 ml/hl.**FLOREALI:** in campo ed in serra contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi: 80-90 ml/hl.**ORNAMENTALI E VIVAI:** in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonie, larve di lepidotteri: 80-90 ml/hl.

**COMPATIBILITA'**- Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**AVVERTENZA:** per i trattamenti in pieno campo rispettare bande di rispetto dai corpi idrici come indicato in tabella.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** aglio, cipolla, porro, foglie di sedano, patata, cavoli di bruxelles, carota, olivo da olio, ciliegio e susino: 7 giorni; cotone, erba medica: 15 giorni; agrumi, mandorlo, frumento, barbabietola da zucchero: 30 giorni. Altre colture : 3 giorni.

**“ATTENZIONE”** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Colture	Banda di rispetto (metri)			
	in assenza di dispositivi antideriva	con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva		
		fino al 30%	fino al 50%	fino al 90%
<b>Melo, pero</b> <i>Applicazioni precoci</i>	20	15	10	5
<i>Applicazioni tardive</i>	-	-	-	-
<b>Drupacee, agrumi, fruttiferi a guscio, olivo</b> <i>Applicazioni precoci</i>				
<i>dose min</i>	20	10	5	-
<i>dose max</i>	20	20	10	-
<i>Applicazioni tardive</i>	-	-	-	-
<b>Vite</b> <i>Applicazioni precoci</i>				
<i>dose min</i>	5	5	5	3
<i>dose max</i>	10	10	10	3
<i>Applicazioni tardive</i>				
<i>dose min</i>	10	10	10	3
<i>dose max</i>	20	15	15	5
<b>Cotone</b> <i>dose max</i>	10	5	5	-
<b>Cereali, ortaggi, patata, fragola, erba medica, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo</b>	5	5	-	-

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

# AUDACE® SC

**Insetticida in sospensione concentrata**

**MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 3A**

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.**

**P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

## TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A.

Via Tonale 15

ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

## OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

## OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO E/O RI-ETICHETTATURA:

STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Via E. Torricelli 2 - 48033 Cotignola (RA)

Althaller Italia S.r.l. Strada Com.le per Campagna 5 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)

## OFFICINA DI RI-ETICHETTATURA:

Arco Logistica S.r.l. Via Antonio Battistella 22 - 44123 Ferrara (FE)

## DISTRIBUITO DA

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti 32/28- 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Registrazione Ministero della Salute n. 17951 del 13/01/2022

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 1-5-10-30-50-60-100

PARTITA N.



ATTENZIONE

® Audace è un marchio FMC Corporation o di sue società affiliate

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 13 gennaio 2022