# EXCELERO

(CONCENTRATO SOLUBILE)

## Fitoregolatore per la colorazione dell'uva (varietà rosse) e il dirado delle uve da tavola

EXCELERO - Registrazione del Ministero della Salute n° 16320 del 24/12/2015

| **Composizione** | | |
|---|---|---|
| **Acido S-Abscissico** | **g** | **10 (=104 g/L)** |
| **Coformulanti q.b. a** | **g** | **100** |


**SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.**
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. + 33 04 78 64 32 60


Contenuto: 2-4-5-10 L Partita N.

Stabilimento di produzione:
**A to Z Drying Inc.**
1000 Wallace Road - Osage, IA 50461 U.S.A.

Distribuito da:
**SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl**
Via Caldera, 21 - 20153 Milano Tel 02 452801

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**
**P261 Evitare di respirare gli aerosol; P261 Evitare il contatto con occhi, la pelle o gli indumenti; P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.**
**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**
**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**
**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:**
**EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
**Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri, con 10 metri vegetati, dai corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**CARATTERISTICHE**
EXCELERO è un regolatore di crescita in formulazione liquida contenente Acido S-Abscissico (ABA), fitormone comunemente presente nelle piante. Il prodotto favorisce la colorazione dell'uva rossa e il dirado degli acini in eccesso delle uve da tavola.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO**
**VITE (uva - varietà rosse - colorazione degli acini)**
Il prodotto favorisce e incrementa la colorazione degli acini dell'uva rossa consentendo l'anticipo della raccolta e la massimizzazione della resa. L'effetto dei risultati dipende dalla varietà e dalle condizioni del vigneto.
**Dosi d'impiego**
Effettuare 1-3 applicazioni di EXCELERO partendo dall'invaiatura fino alla raccolta con un intervallo minimo di 7 giorni.
I migliori risultati si ottengono impiegando 400 ml/hl di prodotto con volumi d'acqua pari a 1.000 l/ha. L'applicazione deve essere direzionata sulla fascia dei grappoli.
La dose massima per ettaro non deve superare i 4 litri per singolo trattamento.
Assicurare una completa e uniforme bagnatura dei grappoli al fine di garantire una totale copertura degli stessi in entrambi i lati, evitando il gocciolamento della soluzione.

**VITE (uva da tavola – dirado degli acini)**
Il prodotto promuove e favorisce la cascola degli acini in eccesso nelle uve da tavola e può essere efficacemente utilizzato per ridurre la compattezza del grappolo, ridurre i costi di diradamento manuale e aumentare la pezzatura degli acini, il peso del grappolo e la resa complessiva.
Il prodotto è stato ampiamente testato sulla cultivar 'Italia'.
I risultati dipendono dalla varietà e dai cloni di uva e dalle condizioni ambientali e colturali del vigneto.

**Dosi d'impiego**
Effettuare 1-2 applicazioni di EXCELERO per stagione alla dose di 1,2 – 2,4 l/ha per trattamento, iniziando dall'80-90% della fioritura con un intervallo minimo di tre giorni. La dose più alta e la doppia applicazione sono raccomandati nel caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di acini di dimensioni ridotte e nel caso si voglia effettuare un maggiore diradamento.
I migliori risultati si ottengono impiegando 400 ml/hl di prodotto con volumi d'acqua di 600 l/ha (equivalenti a 2,4 l/ha) e dirigendo l'applicazione sulla fascia dei grappoli. La dose massima per ettaro non deve superare i 2,4 litri per applicazione. Ridurre la dose di prodotto a 200 ml/hl se sono previste temperature superiori a 30°C per diversi giorni dopo l'applicazione.
Trattare accuratamente la zona dei grappoli, assicurando una completa ed uniforme bagnatura, evitando il gocciolamento.

**Avvertenza:** al fine di ottenere i migliori risultati si consiglia di effettuare il trattamento in presenza di alta umidità relativa (mattina presto o sera tardi) e in assenza di clima secco. Una copertura insufficiente può ridurre la colorazione o limitare lo sviluppo uniforme del colore nei grappoli e limitare la cascola degli acini in eccesso. Applicare la soluzione di irrorazione entro 24 ore dalla preparazione.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto si impiega da solo.

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**


**Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 settembre 2021**