Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

CYPRUS® 25 WG

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
NEL RISPETTO DEL REG. (CE) N° 834/2007

Biorazionale®

FUNGICIDA POLIVALENTE

COMPOSIZIONE

Rame metallo 25 %
(sotto forma di ossicloruro)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 17204 del 29-03-2018	WG Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)	Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.	864 1000	1 kg 10 kg	 ATTENZIONE H319, H410, EUH401

BUFFER ZONE	GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
10 metri da corpi idrici superficiali - 20 metri da corpi idrici superficiali per pomacee, drupacee, noce, nocciolo.	M1	3077	9	Nufarm	Nufarm Italia S.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Vite	Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*	240-265 g/hl 2,4-2,650 kg/ha	Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso.	21 gg in post-fioritura	6
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno)	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigme inaequalis* e *V. pyrina = Endostigme pyrina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*	190-200 g/hl 2,280-3 kg/ha	Trattamenti autunno-invernali e cancri.	—	3
		150-170 g/hl 1,8-2,550 kg/ha	Trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.		4
	Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*	55-70 g/hl 0,660-1,050 kg/ha	Nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili.		4
	Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*	20-50 g/hl	Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 20-50 g/hl (massimo 3 kg/ha).		1
Nespolo	Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*	200-270 g/hl 2-3,240 kg/ha	Trattamenti autunno-invernali. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.	—	4
Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino)	Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee *(Xanthomonas campestris pv. pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*	225-240 g/hl 2,250-2,880 kg/ha	Solo trattamenti autunno-invernali.	—	4
	Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*	30-60 g/hl	Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 30-60 g/hl (massimo 2,4 kg/ha).		1
Agrumi	Marciume o Gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora* spp.*)*, Allupatura (*Phytophthora* spp.), Fumaggine *(Capnodium citri)*, Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*. Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi *(Xanthomonas campestris)*	200-300 g/hl 2-3 kg/ha	Trattamenti a partire da fine inverno.	—	3
Olivo	Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp.*)*	225-310 g/hl 2,250-3,1 kg/ha	Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie.	14 gg	3
Actinidia	Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*	300 g/hl 3 kg/ha	Per interventi sul bruno.	—	2
	Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*	75-140 g/hl	Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 75-140 g/hl (massimo 5,6 kg/ha).		1

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Segue

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

CYPRUS® 25 WG

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno e Mandorlo)	Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola),* Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis).* Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis),* Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina),* Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae)*	225-240 g/hl 2,250-2,4 kg/ha	Trattamenti autunno-invernali.	—	2
		Mandorlo: 225-240 g/hl 2,250-2,880 kg/ha			4
Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, Uva spina)	Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*	220-240 g/hl 1,760-2,4 kg/ha	Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa.	—	2
Pomodoro	Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans),* Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica),* Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv. *tomato),* Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*	195-225 g/hl 1,950-2,250 kg/ha	Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo la necessità.	3 gg pomodoro da mensa 10 gg pomodoro da industria	4
Melanzana	Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*	155-210 g/hl 1,550-2,1 kg/ha		3 gg	2
Patata	Peronospora *(Phytophthora infestans),* Alternariosi *(Alternaria porri* f.sp. *solani).* Attività collaterale contro Batteriosi.	170-210 g/hl 1,7-2,1 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	14 gg	4
Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino) in campo e serra Cucurbitacee con buccia non commestibile (Anguria, Melone, Zucca) solo in campo	Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis),* Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium),* Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*	155-210 g/hl 1,240-2,1 kg/ha	Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo la necessità.	3 gg buccia edibile 7 gg buccia non edibile	2
Ortaggi a bulbo (Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno)	Peronospora *(Peronospora schleideni)*	160-210 g/hl 0,960-2,1 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	3 gg	5
Ortaggi a foglia (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/ Radicchio, Rucola, Spinacio)	Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae),* Alternariosi delle crucifere *(Alternaria porri* f.sp. *cichorii),* Antracnosi delle insalate *(Marssonina panottoniana),* Peronospora dello spinacio *(Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae),* Antracnosi dello spinacio *(Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae),* Marciume batterico della lattuga *(Pseudomonas cichorii),* Maculatura batterica della lattuga *(Xanthomonas campestris* pv. *vitians)*	160-210 g/hl 0,960-2,1 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	7 gg	5
Cavoli a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Peronospora delle crucifere *(Peronospora brassicae),* Micosferella del cavolo *(Mycosphaerella brassicicola),* Alternariosi del cavolo *(Alternaria brassicicola, A. brassicae).* Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo *(Xanthomonas campestris* pv. *campestris)*	160-210 g/hl 0,960-2,1 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	14 gg	5
Legumi freschi e da granella (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava)	Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum lindemuthianum),* Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli),* Peronospora del pisello *(Peronospora pisi),* Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi),* Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae),* Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola),* Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli),* Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*	160-210 g/hl 0,960-2,1 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	3 gg	5

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Segue

CYPRUS® 25 WG

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Floreali (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.) Ornamentali (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) Forestali (Cipresso, ecc.)	Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Alternariosi del garofano *(Alternaria dianthi)*, Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*. Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.	110-150 g/hl 0,660-1,5 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	—	2
Cipresso	Cancro del cipresso *(Coryneum=Seiridium cardinale)*	290-360 g/hl 2,320-3,6 kg/ha	Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno.	—	3
Tabacco	Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)*, Marciume basale del fusto *(Phytophthora nicotianae)*	140-180 g/hl 1,4-1,8 kg/ha	Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	—	2

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose e barbabietola da zucchero). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Non trattare durante la fioritura. Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: – 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate; – 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per agrumi e olivo; – 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)