Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

ESQUIVE® WP

FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DI *TRICHODERMA ATROVIRIDE*, CEPPO I-1237, CONTRO LE MALATTIE DEL LEGNO DELLA VITE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL RISPETTO DEL REG. (CE) N° 834/2007

Biorazionale®

COMPOSIZIONE

Trichoderma atroviride (ceppo I-1237) da 5 a 50 % (pari a 10^8 UFC/g)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 16951 del 13-06-2018	WP Polvere bagnabile	Il prodotto si impiega da solo.	400	1 kg	EUH208, EUH401

BUFFER ZONE	GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
5 metri da zone non coltivate/corpi idrici superficiali.	BM02	—	—	Agrauxine SA	Agrauxine SA

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE		PHI	n. trattamenti
Vite	Eutipiosi *(Eutypa lata)*, Mal dell'esca *(Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum, Fomitiporia punctata, Eutypa lata)*, Black Dead Arm *(Botryosphaera obtusa, Botryosphaera dothidea, Neofusicoccum parvum)*	4 kg/ha	Nebulizzazione delle ferite da potatura. Utilizzare un volume di acqua che permetta di coprire tutte le ferite da potatura senza superare il punto di ruscellamento.	Si consiglia di intervenire il più rapidamente possibile dopo la potatura (stadio gemme dormienti) comunque entro e non oltre 2 settimane dalla potatura. Avere cura di raggiungere le ferite da taglio e le anfrattuosità della corteccia. L'efficacia del prodotto aumenta in caso di utilizzo in combinazione con pratiche di coltura profilattiche (potatura tardiva, ceduazione, limitazione dell'inoculo alle vicinanze delle parcelle trattate con l'eliminazione dei ceppi di viti morte).	—	1
		100 g/l	Spennellatura delle ferite da potatura.		—	1

PHI: Tempo di carenza

- Attivo anche a basse temperature (5°C)
- Impiegabile subito dopo la potatura
- Subito pronto all'uso: non necessita di pre-attivazione
- Massima affinità con le fibre del legno, ottima penetrazione ben oltre la linea di taglio

Indicazioni per il corretto impiego - Grazie alle sue modalità d'azione, Esquive WP limita e ritarda la progressione dei diversi gruppi patogeni presenti nel legno della vite, contribuendo pertanto alla riduzione della diffusione dei sintomi nel vigneto ed in particolare dei ceppi affetti da apoplessia. Esquive WP costituisce una valida soluzione di biocontrollo, utilizzabile in agricoltura biologica secondo il Regolamento (CE) n. 889/2008.
Applicare una quantità sufficiente di spray per garantire una copertura completa delle piante senza dilavamento. Per un risultato ottimale, far sì che segua un periodo di 48 senza pioggia dal momento dell'applicazione. Conservare il contenitore ben sigillato in un luogo fresco (max 20°C), asciutto, ben ventilato e al riparo dalla luce. Conservare il prodotto sempre nella confezione originale: una volta aperti, i sacchetti devono essere utilizzati lo stesso giorno.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zone non coltivate/corpi idrici superficiali.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni