JOCOTO 25 WG

ERBICIDA selettivo per il diserbo di vite, agrumi e olivo
Granuli Idrodisperdibili (WG)
Meccanismo d'azione: gruppo B2 (HRAC)

JOCOTO 25 WG
Registrazione Ministero della Salute n. 17646 del 17/09/2020

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FLAZASULFURON puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

ASCENZA Italia S.r.l.
Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) -Tel: +39 0284944669

Stabilimento di produzione:
ASCENZA AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)
Torre S.r.l. Unipersonale – via Pian D'Asso Torrenieri (SI)

Stabilimento di rietichettatura:
Arco Logistica S.r.l. Via Antonio Battistella, 22 - 44123 – Ferrara

Distribuito da:
ADAMA ITALIA Via Zanica 19K, Grassobbio (BG) 24050; AGRYSISTEM S.r.l Via dei Bizantini 216, Lamezia Terme (CZ) 88046; BELCHIM CROP PROTECTION Italia S.p.A. Ingresso 3 Palazzo N Str.6 Rozzano (MI) 20089; CERTIS Europe B.V. Via Varese, 25D, 21047 Saronno (VA); Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG), Italia Tel. 0363 355611; GOWAN ITALIA Via Giovan Battista Morgagni, 68, 48018 Faenza RA; SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena; SIPCAM Italia S.p.A Via Carroccio 8 Milano; SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Via Caldera 21,20153 Milano; UPL S. Carlo di Cesena (FC) 47522 - Via Terni, 275

Taglia: 100 g, 500 g, 1 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le misure di mitigazione indicate in tabella:

Coltura	*Applicazione*	*Distanza da corpi idrici superficiali*
Vite	-	20 m di fascia vegetata non trattata
Agrumi	-	10 m di fascia vegetata non trattata
Olivo	Primaverile	10 m di fascia vegetata non trattata
	Autunnale	20 m di fascia vegetata non trattata
Aree non coltivate	-	10 m di fascia non trattata
Aree urbane	Applicazione meccanica	10 m di fascia non trattata

Per proteggere le acque sotterranee e gli organismi acquatici non applicare su più del 50% della superficie per vite e su più del 30% della superficie per agrumi, olivo e aree non coltivate.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.
Durante le operazioni di miscelazione, caricamento e applicazione del prodotto usare guanti e indumenti protettivi.
Indossare indumenti protettivi e guanti per effettuare operazioni di rifinitura manuale. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

JOCOTO 25 WG è un erbicida a base di Flazasulfuron, sostanza attiva dotata di effetto residuale e sistemico appartenente al gruppo delle solfoniluree. **JOCOTO 25 WG** agisce in pre-emergenza e in post emergenza precoce delle infestanti contro numerose malerbe graminacee e dicotiledoni sia annuali che perenni. Il prodotto viene rapidamente assorbito attraverso le radici e le foglie, traslocato per via floematica e xilematica sia in senso ascendente che discendente all'interno della pianta, andando ad inibire l'enzima Acetolattato sintetasi, uno degli enzimi responsabili della biosintesi degli amminoacidi. In conseguenza all'assorbimento, **JOCOTO 25 WG** inibisce la sintesi delle proteine e causa rapidamente il blocco della crescita delle infestanti colpite, seguito dalla decolarazione delle nuove foglie in via di sviluppo e la graduale morte dell'intera pianta.

INFESTANTI CONTROLLATE
APPLICAZIONI SU INFESTANTI EMERSE:
Al fine di garantire una efficacia ottimale per le applicazioni su infestanti emerse si consiglia di applicare **JOCOTO 25 WG** su infestanti fino ad un massimo di 4 foglie di sviluppo.
INFESTANTI SENSIBILI: Amaranto (*Amaranthus* spp.), Farinello (*Chenopodium album*)*, Coniza (*Conyza canadensis*)*, Rucola selvatica (*Diplotaxis erucoides*), Loiessa (*Lolium multiflorum*)*, Malva (*Malva* spp.)*, Portulaca (*Portulaca oleracea),*Senecione (*Senecio vulgaris*).
INFESTANTI MODERATAMENTE SENSIBILI: Geranio selvatico (*Geranium dissectum*)*.
*si consiglia di applicare la dose massima di etichetta al fine di garantire una ottimale efficacia

APPLICAZIONI IN PRE-EMERGENZA DELLE INFESTANTI:
Al fine di garantire una efficacia ottimale per le applicazioni su infestanti non ancora emerse si consiglia di applicare **JOCOTO 25 WG** uniformemente sul terreno al fine di creare uno strato uniforme sulla superficie del suolo. A tal fine la presenza di infestanti poco sviluppate è garanzia di migliore effetto residuale.
INFESTANTI SENSIBILI: Amaranto (*Amaranthus* spp), Farinello (*Chenopodium album*), Coniza (*Conyza canadensis*), Rucola selvatica (*Diplotaxis erucoides*), Geranio selvatico (*Geranium dissectum*)*, Senecione (*Senecio vulgaris*), Setaria (*Setaria* spp.) .
*si consiglia di applicare la dose massima di etichetta al fine di garantire una ottimale efficacia.

DOSI, EPOCA E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite (**uva da tavola e da vino**): Intervenire sulla fila effettuando il trattamento fra fine inverno e inizio primavera alla dose di 60-200 g/ha. Intervenire su infestanti ad un massimo di 4 foglie vere di sviluppo, utilizzando volumi di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha. Effettuare un solo intervento per ciclo colturale.

Agrumi (**Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo**): Intervenire sulla fila effettuando il trattamento fra fine inverno e inizio primavera alla dose di 60-200 g/ha. Intervenire su infestanti ad un massimo di 4 foglie vere di sviluppo, utilizzando volumi di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha in caso di applicazioni con trattore. Effettuare un solo intervento per ciclo colturale.

Olivo: Intervenire sulla fila o sotto la piazzola effettuando il trattamento in primavera alla dose di 60-200 g/ha o in autunno alla dose di 60-100 g/ha. Intervenire su infestanti ad un massimo di 4 foglie vere di sviluppo, utilizzando volumi di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha in caso di applicazioni con trattore. Effettuare un solo intervento per ciclo colturale.

Aree non coltivate (**strade, autostrade, aree industriali, opere civili – ruderi storici, cimiteri, piazzali e banchine stradali, aree urbane e agricole non coltivate**): effettuare il trattamento con infestanti in fase iniziale di sviluppo, ad un massimo di 4 foglie vere, alla dose di 60-200

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/09/2020 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 19/12/2020

g/ha utilizzando volumi di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha.
Effettuare un solo intervento per anno.

Applicare unicamente mediante mezzi meccanici.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
La dose più alta garantisce una prolungata attività residuale. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza è importante alternare il prodotto con principi attivi dotati di differente meccanismo di azione. Si consiglia di monitorare regolarmente l'attività del prodotto, seguendo scrupolosamente le indicazioni applicative riportate in etichetta (non applicare a dosi superiori o inferiori, in modo troppo anticipato o troppo tardivo), integrando metodi di controllo chimico e agronomico. Irrigazioni o piogge cadute entro 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia dell'erbicida e l'attività su infestanti già emerse. L'intervento potrebbe inoltre risultare insufficiente in caso di infestanti stressate da fattori climatici (siccità, freddo, eccesso idrico...). Si consiglia di applicare il prodotto con un coadiuvante tensioattivo non ionico al fine di migliorare l'aderenza, la distribuzione e l'assorbimento del prodotto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

COMPATIBILITA' - Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture limitrofe, anche sottoforma di deriva. Non trattare direttamente l'apparato fogliare di vite, agrumi e olivo. Si consiglia di applicare su colture ben radicate e ben lignificate al fine di evitare fenomeni, seppure rari, di fitotossicità.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima su olivo per applicazioni in autunno

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/09/2020 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 19/12/2020

JOCOTO 25 WG

ERBICIDA selettivo per il diserbo di vite, agrumi e olivo
Granuli Idrodisperdibili (WG)
Meccanismo d'azione: gruppo B2 (HRAC)

JOCOTO 25 WG
Registrazione Ministero della Salute n. 17646 del 17/09/2020

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FLAZASULFURON puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

ASCENZA Italia S.r.l.
Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) -Tel: +39 0284944669

Stabilimento di produzione:
ASCENZA AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)
Torre S.r.l. Unipersonale – via Pian D'Asso Torrenieri (SI)

Stabilimento di rietichettatura:
Arco Logistica S.r.l. Via Antonio Battistella, 22 - 44123 – Ferrara

Distribuito da:
ADAMA ITALIA Via Zanica 19K, Grassobbio (BG) 24050; AGRYSISTEM S.r.l Via dei Bizantini 216, Lamezia Terme (CZ) 88046; BELCHIM CROP PROTECTION Italia S.p.A. Ingresso 3 Palazzo N Str.6 Rozzano (MI) 20089; CERTIS Europe B.V. Via Varese, 25D, 21047 Saronno (VA); Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG), Italia Tel. 0363 355611; GOWAN ITALIA Via Giovan Battista Morgagni, 68, 48018 Faenza RA; SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena; SIPCAM Italia S.p.A Via Carroccio 8 Milano; SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Via Caldera 21,,20153 Milano; UPL S. Carlo di Cesena (FC) 47522 - Via Terni, 275

Taglia: 100 g Partita n. vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/09/2020 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 19/12/2020