

MaxCel® 2 SL

Concentrato Solubile

Fitoregolatore per il diradamento del melo e del pero a base di 6-Benziladenina

COMPOSIZIONE

6-Benziladenina pura g. 1,9 (=20 g/l)
Formulanti q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute
n° 15839 del 14/10/2013
Partita N°.....

Quantità netta del preparato:
1, 2, 5, 10, 20 L



Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

distributore:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 452801

Stabilimenti di produzione:

SBM Formulation – Bezières Cedex (Francia)
A-Z Drying Inc.

1000 Wallace Road, Osage, IA 50461 - (USA)
Kwizda Agro GmbH – Laaer Strasse/Kwizda Allee, 1
2100 Leobendorf (Austria)

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Str. 127
D-39218 Schoenebeck (Germania)

Schirm GmbH - Halchtersche Strasse 33
38304 Wolfenbüttel (Germania)

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

REAZIONE: P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Propilester dell'acido 3,4,5-triidrossibenzoico. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento e durante l'applicazione manuale con pompa a spalla. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento per applicazione da automezzo. I lavoratori devono indossare indumenti protettivi quando si compiono operazioni su piante trattate con il preparato. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio. **TERAPIA:** sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

MaxCel® 2 SL contiene 1.9% (p/p) di 6-Benziladenina, un fitoregolatore appartenente al gruppo delle citochinine. Questa sostanza causa diradamento dei frutticini laterali e contemporaneamente aumenta la dimensione dei frutti promuovendo anche un adeguato ritorno a fiore nella stagione successiva all'applicazione.

COLTURE AUTORIZZATE: Melo e pero

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	USO	Dosi	Volume d'acqua	Momento d'applicazione
MELO	Per diradamento dei frutticini, per un aumento del diametro e per favorire il ritorno a fiore.	Concentrazione della Soluzione: Da: 375 ml di MaxCel® 2 SL per hl (pari a 75 ppm di sostanza attiva) A: 750 ml di MaxCel® 2 SL per hl (pari a 150 ppm di sostanza attiva) Max 150g s.a./ha	Applicare le dosi raccomandate in un volume sufficiente di acqua per assicurare una adeguata copertura sia dei frutti che delle foglie senza raggiungere il gocciolamento.	Applicare MaxCel® 2 SL quando la media dei frutticini è tra i 10 e 12 mm, e quando la temperatura massima del giorno e dei 2-3 giorni successivi è almeno di 15 °C. Temperature massime di 20-25°C sono ideali per l'uso di MaxCel® 2 SL .
PERO	Per diradamento dei frutticini, per un aumento del diametro e per favorire il ritorno a fiore.	Concentrazione della Soluzione: 750 ml di MaxCel® 2 SL per hl (pari a 150 ppm di sostanza attiva) Max 150g s.a./ha	Adeguare il volume di soluzione in base alla forma e alla spaziatura degli alberi.	Per risultati ancora migliori applicare MaxCel® 2 SL con condizioni di elevate umidità relative ed in assenza di vento. Effettuare un solo trattamento per anno.

Preparazione della miscela: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Adattare la dose alla varietà, alle condizioni climatiche e ambientali e all'intensità di diradamento che si intende raggiungere. L'impiego delle dosi maggiori è consigliato nelle seguenti condizioni:
 - a) in frutteti che risultano essere difficili da diradare;
 - b) con varietà difficili da diradare;
 - c) con temperature basse al momento del trattamento.

- Una pioggia o un'irrigazione sovrachiosa entro le 6 ore dal trattamento con **MaxCel® 2 SL** può ridurre l'attività del prodotto.

- MaxCel® 2 SL** va impiegato con un pH dell'acqua tra 5 e 7; mai superare 8,5.

- Ci si deve aspettare un effetto diradante di maggiore entità se il trattamento viene effettuato a temperature maggiori di 30° C.

COMPATIBILITÀ: Solo le miscele autorizzate possono essere utilizzate. Tutte le associazioni devono comunque essere testate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non applicare **MaxCel® 2 SL** su alberi di melo e pero che siano sotto stress idrico o nutrizionale o di qualunque altro tipo. Date le caratteristiche del prodotto, l'applicazione su varietà nuove o di recente introduzione deve essere preceduta da saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



© Marchio registrato Valent Biosciences Corporation, U.S.A