

# MAXCEL® 2SL

FITOREGOLATORE A BASE DI 6-BENZILADENINA  
PER IL DIRADAMENTO DEL MELO



## COMPOSIZIONE

6-benziladenina pura 1,9 %  
(= 20 g/l)

| REGISTRAZIONE                                                              | FORMULAZIONE                                     | MISCIBILITÀ                                                                                                           | PALLET (kg/l)          | CONFEZIONI                | INDICAZIONI<br>DI PERICOLO CLP |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| N° 15839 del 14-10-2013                                                    | SL<br>Liquido (concentrato)<br>solubile in acqua | Solo le miscele autorizzate<br>possono essere utilizzate. Tutte<br>le associazioni devono comunque<br>essere testate. | 360                    | 2 L                       | EUH208, EUH401                 |
| BUFFER ZONE                                                                |                                                  | TRASPORTO<br>ONU                                                                                                      | CLASSIFICAZIONE<br>ADR | MARCHIO<br>REGISTRATO     |                                |
| 5 metri da corpi idrici superficiali -<br>5 metri da vegetazione naturale. |                                                  | —                                                                                                                     | —                      | Valent<br>BioSciences LLC |                                |

| COLTURA | AVVERSITÀ / UTILIZZO                                                                                 | DOSE                                                                                                       | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PHI   | n.<br>trattamenti |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Melo    | Per diradamento dei frutticini,<br>per un aumento del diametro<br>e per favorire il ritorno a fiore. | Da: 375 ml/hl<br>(pari a 75 ppm di sostanza attiva)<br>a: 750 ml/hl<br>(pari a 150 ppm di sostanza attiva) | Applicare MaxCel 2 SL quando la media dei frutticini è<br>tra i 10 e 12 mm, e quando la temperatura massima del<br>giorno e dei 2-3 giorni successivi è almeno di 15 °C.<br>Temperature massime di 20-25 °C sono ideali per l'u-<br>so di MaxCel 2 SL.<br>Per risultati ancora migliori applicare MaxCel 2 SL con<br>condizioni di elevate umidità relative ed in assenza di<br>vento.<br>Effettuare un solo trattamento per anno.<br>Applicare le dosi raccomandate in un volume sufficien-<br>te di acqua per assicurare una adeguata copertura sia<br>dei frutti che delle foglie senza raggiungere il goccio-<br>lamento.<br>Adeguate il volume di soluzione in base alla forma e<br>alla spaziatura degli alberi. | 90 gg | 1                 |

PHI: Tempo di carenza

**Indicazioni per il corretto impiego** - Adattare la dose alla varietà, alle condizioni climatiche e ambientali e all'intensità di diradamento che si intende raggiungere. L'impiego delle dosi maggiori è consigliato nelle seguenti condizioni: meleti che risultano essere difficili da diradare; varietà difficili da diradare; temperature basse al momento del trattamento. Una pioggia o un'irrigazione sovrachiosa entro le 6 ore dal trattamento con MaxCel 2SL può ridurre l'attività del prodotto. MaxCel 2SL va impiegato con un pH dell'acqua tra 5 e 7; mai superare 8,5. Ci si deve aspettare un effetto diradante di maggiore entità se il trattamento viene effettuato a temperature maggiori di 30° C. Non applicare MaxCel 2SL su alberi di melo che siano sotto stress idrico o nutrizionale o di qualunque altro tipo. Date le caratteristiche del prodotto, l'applicazione su varietà nuove o di recente introduzione deve essere preceduta da saggi preliminari su piccole superfici.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento e durante l'applicazione manuale con pompa a spalla. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento per applicazione da automezzo. I lavoratori devono indossare indumenti protettivi quando si compiono operazioni su piante trattate con il preparato. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni