

SYNERO®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER LE AREE INCOLTE INERBITE

COMPOSIZIONE

Aminopyralid
triisopropanolammonium
 puro 2,22 % (23,1 g/l, pari a
 12 g/l di acido equivalente)
Triclopyr triethylammonium
 puro 16,09 %
 (167,4 g/l, pari a 120 g/l di
 acido equivalente)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP	
N° 14867 del 14-11-2012	SL Liquido (concentrato) solubile in acqua	In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo	720	1 L	 ATTENZIONE H319, H373, H410, EUH401	
BUFFER ZONE	GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO		TITOLARE REGISTRAZIONE
Non applicare in autunno per proteggere le acque sotterranee - 5 m da vegetazione naturale da tutelare	O	—	—	Dow		Dow AgroSciences Italia s.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Aree incolte inerbite: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline.	Ambrosia (<i>Ambrosia artemisifolia</i>), Buddleja (<i>Buddleja davidii</i>), Stoppione (<i>Cirsium arvense</i>), Vitalba (<i>Clematis vitalba</i>), Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>), Ginestra (<i>Cytisus scoparius</i>), Frassino (<i>Fraxinus</i>), Fitolacca (<i>Phytolacca americana</i>), Poligono giapponese (<i>Polygonum japonicum</i>), Prugno selvatico (<i>Prunus spinosa</i>), Robinia (<i>Robinia pseudacacia</i>), Rovo (<i>Rubus</i>), Romice crespo (<i>Rumex crispus</i>), Sambuco ebbio (<i>Sambucus ebulus</i>), Ginestrone (<i>Ulex europaeus</i>), Ortica minore (<i>Urtica urens</i>)	4 l/ha	Trattamenti a pieno campo: bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro, utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla, in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.	—	1
		2 l/hl d'acqua fino ad un massimo di 4 l/ha	Trattamenti localizzati: bagnare uniformemente le infestanti, senza raggiungere il gocciolamento, utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore, dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.		
			Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici, non tagliare l'erba o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.		

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Synero è un erbicida sistemico di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare Synero su infestanti in attiva crescita, nelle prime fasi vegetative, evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi. Synero è selettivo su specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba, ma questi sono transitori e rapidamente superati. Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma nè a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli o piante sensibili. Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare Synero in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini, per rinvasi, o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

Per proteggere le acque sotterranee, non applicare in autunno. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da vegetazione naturale da tutelare. Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e caricamento; guanti, tuta (Cat. III Tipo 5/6) e stivali durante l'applicazione della miscela. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni