




CURAME 25 WG

FUNGICIDA

**DOPPIA
EFFICACIA
CONTRO LA
PERONOSPORA**



2x2

DUE MOLECOLE. PIÙ EFFICACIA, PIÙ SICUREZZA.

Curame 25 wg, frutto della ricerca Manica, unisce due molecole tradizionali (rame e cymoxanil) che insieme esplicano un'efficacia eccezionale nella difesa antiperonosporica di colture fondamentali come vite, pomodoro ed altre ortive.

LE MOLECOLE

RAME: Curame 25 wg contiene il 25% di rame metallo (sotto forma di ossicloruro di rame) il quale garantisce un'ottima copertura della vegetazione trattata in prevenzione delle piogge infettanti e una buona persistenza al dilavamento.


CYMOXANIL: fungicida ad azione preventiva e curativa che agisce contro le peronospore sia per contatto sugli elementi di propagazione, sia all'interno della pianta, svolgendo un'azione endoterapica e inibendo lo sviluppo del micelio.

Penetra nei tessuti entro 6 ore dal trattamento con azione citotropica e translaminare. Mantiene l'attività fungicida anche a dosi molto basse e possiede un limitato effetto residuo (4-6 giorni).


L'EFFICACIA

L'abbinamento di un principio attivo di copertura (rame) ad uno citotropico (cymoxanil) garantisce un'elevata efficacia anche a basse dosi di formulato (2,5 kg/ha); inoltre si evita l'eventuale insorgenza di ceppi resistenti grazie all'azione multi sito svolta dal rame.

NON TRATTATO



TRATTATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Reg. n°13150 del 03.03.2006

Cymoxanil: 4%

Rame da ossicloruro: 25%

Fungicida citotropico e di contatto, con azione curativa e preventiva

Microgranuli idrodispersibili (WG)

Sacchetti da 1 kg e 5 kg

Blu o non colorato

Il dosaggio di 2,5 kg/ha su vite apporta un quantitativo di rame metallo di soli 625 g: in questo modo l'agricoltore rimane più facilmente nei limiti dei 4 kg/ha anno di rame.

MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	PATOLOGIA	EPOCA D'IMPIEGO	DOSI (G/HL)	N° MAX TRATTAMENTI ALL'ANNO	INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG.)
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	Trattamenti pre-fiorali Trattamenti post-fiorali Trattamenti di "chiusura"	250 - 300 250 - 300 250 - 300	4	8 - 10
POMODORO in campo	Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i>)	Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	280 - 600	5	8 - 10
CUCURBITACEE (cetriolo e melone) in campo	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	280 - 600	4	8 - 10

MISCIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.
Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina.

TEMPO DI CARENZA

10 gg. altre colture
33 gg. vite

www.manica.com

MANICA spa
via all'Adige 4
38068 Rovereto TN Italia
Tel. +39 0464 433705
Fax +39 0464 458235

