

REGNUM® 25 EC

Fungicida per il controllo di oidio su vite
Emulsione Concentrata

REGNUM® 25 EC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Pyraclostrobin puro g 23,6(=250 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: Nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H332 Nocivo se inalato. H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. P261 Evitare di respirare la nebbia. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sциaquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. P303 +P361 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare con acqua abbondante e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P331 NON provocare il vomito. P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P311 Se l'irritazione degli occhi persiste: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P403 Conservare in luogo ben ventilato. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto / recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 17522 del 28.02.2020

Distribuito da:

GOWAN ITALIA S.r.l. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA).

Officine di produzione:

TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI) - Italia

BASF SE - Ludwigshafen - Germania

BASF Espanola S.L. - Tarragona - Spagna

BASF Agri-Production S.A.S. - Genay - Francia

Officine di rietichettatura:

Ita.Fer.T Snc - Canale (CN) - Italia

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato



PERICOLO

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REGNUM 25 EC è un fungicida di copertura, con attività preventiva.

Il suo principio attivo PYRACLOSTROBIN appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne ha pertanto il meccanismo di azione. REGNUM 25 EC, blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.

Grazie all'ampio spettro di azione, REGNUM 25 EC possiede un'eccellente efficacia contro l'Oidio della vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose ml/ha	Intervallo tra i trattamenti	Numero Massimo di trattamenti
Vite	Oidio	30-40	12-14 giorni	3

Per gran parte dei fungicidi esiste, in generale, il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

La dose si riferisce ad un volume d'acqua normale di 1000 l/ha, ed equivale quindi a 400 g di prodotto per ettaro. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua inferiori, la suddetta dose ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare la dose più alta (40 ml/ha) ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti (12 giorni).

Al fine di assicurare un'efficacia prolungata del prodotto, si consigliano al massimo 3 trattamenti a stagione, possibilmente consecutivi.

Si consiglia di usare REGNUM 25 EC soprattutto nel periodo critico a cavallo della fioritura. Per ottenere un risultato ottimale, l'ultimo trattamento pre-fiorale dovrebbe già essere eseguito con REGNUM 25 EC.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi raccomandate, si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di vite saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER L'UVA DA VINO, 49 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER L'UVA DA TAVOLA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25.11.2020 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 03 gennaio 2022.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.