



ALGICAL

**CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
CON BIOSTIMOLANTE VEGETALE**



Formulazione

Liquida

Composizione

Ossido di calcio (CaO) solubile in
acqua (=10,7% Ca) 15 %

Confezioni

FLACONI

12 x 1 L

TANICHE

4 x 4 L

2 x 10 L

Descrizione prodotto

AlgiCAL, per la presenza di estratti concentrati di alghe marine del genere Laminaria digitata e l'elevato contenuto di calcio, è particolarmente indicato per prevenire e curare numerose fisiopatie derivanti dalla indisponibilità dell'elemento calcio. Alla base del prodotto, c'è una elevata dotazione in alginati (per una migliore veicolazione dei nutrienti all'interno della foglia), in vitamine ed oligosaccaridi (per rafforzare la pianta, permettendo così una sua migliore resistenza agli stress ambientali e fisiologici) ed in microelementi. AlgiCAL per la presenza di calcio da cloruro risulta particolarmente efficace contro la butteratura amara delle MELE. Il prodotto trova valida applicazione anche su pero, pesco, albicocco, ciliegio, susino, pomodoro ecc. per la prevenzione e la cura di tutte quelle fisiopatie riconducibili ad una carenza di calcio. Migliora le caratteristiche qualitative (per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica).

Modalità d'uso

Utilizzare per via fogliare con un volume d'acqua che garantisca una buona copertura fogliare.

Avvertenze



Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare.



ATTENZIONE

Coltura	Impiego	Dosaggio	Trattamento
COLTURE PERENNI - Pesco, Albicocco	Fogliare	8 l/ha	Da 1 a 4 applicazioni ogni 10-12 giorni a partire da 15 giorni dopo all'allegagione.
COLTURE PERENNI - Ciliegio, Susino	Fogliare	8 l/ha	da 1 a 2 applicazioni: ogni 10-12 giorni a partire da 1 mese prima della raccolta.
COLTURE PRENNI - Melo, Pero	Fogliare	8 l/ha	Da 4 a 8 applicazioni: ogni 10-12 giorni a partire dai primi stadi di ingrossamento frutti (stadio I-J).

Prima di concludere il contratto d'acquisto, invitiamo i Sig.ri clienti a prendere visione dei pericoli associati ai prodotti consultando le informazioni riportate nel documento per la sicurezza (Art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)).

COLTURE PERENNI - Vite	Fogliare	5 L/ha	2-3 applicazioni: ogni 10-15 giorni a partire dallo stadio di metà invaiatura.
ORTICOLE - Pomodoro	Fogliare	6-8 L/ha	per ridurre lo spacco delle bacche applicare prima dell'invasatura e ripetere ogni 7-10 giorni.
ORTICOLE - Melone	Fogliare	6-8 l/ha	Applicare prima dell'invasatura e ripetere ogni 7-10 giorni.
ORTICOLE - Peperone	Fogliare	6-8 l/ha	Applicare a partire dall'ingrossamento del frutto e ripetere ogni 7-10 giorni.
ORTICOLE - Ortaggi da foglia	Fogliare	6-8 l/ha	Applicare a partire da 10 giorni dopo il trapianto e ripetere dopo 7 giorni.