

PRODOTTI PER LA DIFESA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Rame metallo puro g 26,2 (=400 g/l)
(sotto forma di idrossido)

Coformulanti q. b. a g 100



PERICOLO

UFI code: Y12D-XVFJ-3G2U-4785

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti dilunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non respirare gli aerosol. Indossare guanti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Continuare il risciacquo. Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ACTION PIN S.A.

30 Rue Gambetta – DAX (Francia)

Tel. +33 (0)5 58550700

Registrazione Ministero della Salute
n° 12170 del 16/04/2004

Stabilimento di produzione: S.I.P.C.

Rue J. Coste – COURCHELLETES (Francia)

Distribuito da: CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel. 035-335313

FUNGICIDA CUPRICO DI CONTATTO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Helio cuivre



BIOGARD
Antigelo First.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità di acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: Gastrolusi con soluzione lattalbuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA:

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

HELIOCUIVRE si presenta sotto forma di soluzione concentrata contenente derivati terpenici estratti dal pino. Questa innovativa formulazione permette a HELIOCUIVRE d'essere particolarmente efficace contro le Peronosspore utilizzando una dose ridotta di rame per ettaro. Il suo utilizzo è pratico e privo di polverosità. HELIOCUIVRE possiede un elevato potere coprente ed una eccellente adesività.

Contenuto netto 5 litri

30482R333/22-04CLP01

Heliocuvire

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

VITE: Contro Peronospora 150-200 ml/hl

MELO-PERO: contro Ticchiolatura: prima della fioritura 200 ml/hl di acqua. Contro Cancri del legno (*Nectria galligena*, *Phomopsis mali*, *Sphaeropsis malorum*, *Pseudomonas syringae*): trattare alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme 250-350 ml/hl. Contro il Colpo di fuoco: effettuare due trattamenti nella fase di rigonfiamento delle gemme e punti verdi 250 ml/hl.

Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

AGRUMI: contro Mal secco, Allupatura, Fumaggine, Lebbra, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio (intervenire prima o dopo la fioritura a seconda della pressione della malattia) 150 ml/hl

OLIVO: contro Occhio di Pavone, Fumaggine e Lebbra (intervenire dopo la raccolta od eventualmente dopo la potatura) 200 ml/hl

MANDORLO: contro Corineo, Bolla, Monilia (intervenire dopo la caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme) 200 ml/hl, contro Batteriosi (intervenire prima della fase dei bottoni rosa) 200 ml/hl

NOCCIOLO: contro Batteriosi (*Xanthomonas corylina*) con due trattamenti in ottobre, distanziati di 20-25 giorni 200 ml/hl

NOCE: contro Antracnosi (in pre-fioritura) 200 ml/hl

NESPOLO: contro Ticchiolatura 150 ml/hl

POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, 200 ml/hl

ORTICOLE (fagiolo, pisello, cavolfiore, cavoli di Bruxelles, broccoli, insalate, cardo, carciofo, rapa, spinacio, sedano, finocchio, melanzane, cetriolo): contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi (*Xanthomonas spp.*, *Pseudomonas spp.*), Antracnosi, Septoria, Cercospora 150 ml/hl

FRAGOLA: contro Vaiolettura lt 1,250/ha

SOIA-GIRASOLE: contro Alternaria, Sclerotinia 200-250 ml/hl

FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Antracnosi, Batteriosi 150 ml/hl

ORNAMENTALI: contro Antracnosi, Batteriosi, Ticchiolatura, Peronospora 150 ml/hl

HELIOCUVIRE può essere utilizzato con qualsiasi apparecchio a basso, alto o volume normale (100÷1000 lt/ha). HELIOCUVIRE si utilizza di preferenza a partire dall'allegagione sino a fine stagione. Si utilizza in applicazioni preventive a una cadenza di 8÷10 giorni tenendo conto dello sviluppo della vegetazione, della malattia e dei rischi di infezione.

Preparazione della poltiglia — Versare HELIOCUVIRE nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, poi sempre sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: HELIOCUVIRE non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, con formulati a base di Tiram e Fosetil Alluminio. Per ogni eventuale miscela con altri formulati, è consigliabile effettuare test preliminari di compatibilità. HELIOCUVIRE è compatibile con HELIOSOUFRE S e le specialità a base di Olii terpenici.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura, eccetto i casi menzionati nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego". Su pesco, nettarine, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Su uva da tavola dopo l'inviatura il prodotto può causare una leggera marcatura sugli acini.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Usare occhiali di protezione durante la preparazione della poltiglia. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il periodo di carenza.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 24.01.2012 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 27.08.2019.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al tempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.



Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune

BIO

Prodotto e marchio registrato



ACTIONPIN
THE NATURE OF EFFECTIVENESS



30482V182/19-03

Rev. 11-2022