## DOSI E MODALITÁ DI IMPIEGO

| COLTURE | DOSAGGIO (kg/ha) | INTERVALLO |
|---|---|---|
| **POMACEE** | 1 - 1.5 | Eseguire 2-3 trattamenti ogni 10 giorni dalla prefioritura. |
| **DRUPACEE** | 1 - 1.5 | Eseguire 2-3 trattamenti ogni 10 giorni dalla scamiciatura. |
| **VITE DA VINO E UVA DA TAVOLA** | 1.5 - 2 | Eseguire 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni dal germogliamento. |
| **FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI** | 1.5 | Intervenire dopo l'attecchimento delle piantine in presenza di micro-carenze complesse e alla ripresa vegetativa 2-3 trattamenti a distanza di 10-14 giorni. |
| **KIWI** | 1.5 - 2 | Eseguire 2-4 trattamenti ogni 10 - 14 giorni dalla formazione delle prime foglie fino alla fioritura. |
| **AGRUMI** | 1.5 - 2 | Intervenire prima della formazione delle gemme, almeno 2-3 trattamenti all'anno distanziati di 14 giorni. |
| **OLIVO** | 1.5 - 2 | Un trattamento dopo l'allegagione. L'eventuale secondo trattamento a distanza di 21 - 28 giorni dal primo. |
| **ORTICOLE** | 1 - 1.5 | Dopo l'attecchimento in presenza di micro-carenze complesse. Ripetere se necessario ogni 10-14 giorni. |
| **PATATA** | 1 - 1.5 | Intervenire sulle prime foglie e in caso di micro-carenze diffuse ripetere ad intervalli di 10-14 giorni. |
| **FLORICOLE E ORNAMENTALI** | 1 - 1.5 | Intervenire alla comparsa dei primi sintomi di micro-carenze complesse, distanziare i trattamenti successivi di 14 giorni. |

LIXOR® MICRO deve essere diluito e impiegato sulla coltura con un volume di bagnatura variabile dai 200 ai 1500 l/ha. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

PER USO PROFESSIONALE. Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.

**CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:**

Attenersi alle informazioni fornite nella scheda di sicurezza.

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:**

Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.


Fabbricante:
**OMEX BV**
Johan Huizingalaan
124d 1065 JE Amsterdam
agrifluids@omex.com
www.omex.com

Distribuito da:
**CBC** (Europe) S.r.l.
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313


CE

BIO

ETICHETTA CONTROLLATA 8-14-0892-04-1 ARVAN

Tappo 2 HDPE Plastica

Flacone 7 EVOH Plastica

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune

8 050539 009106

Riferimento Partita: vedere apposito spazio

Rev. 01/2023

PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE

# LIXOR® MICRO

## CONCIME CE

**PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI**

**In soluzione**



BIOGARD® biological First.

**Contenuto netto 1,3 kg**

Concime a base di microelementi in soluzione.

**COMPOSIZIONE**

Boro (B) nella forma di acido, idrosolubile .... 0,7 %
Rame (Cu) chelato con EDTA, idrosolubile ... 0,2 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile ..... 2 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile ..... 1,5 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile ..... 2 %

Agente chelante: EDTA. Intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile: 4-7,5.

Ingredienti: chelato di ferro EDTA CAS 15708-41-5[1], chelato di zinco EDTA CAS 14025-21-9[1], chelato di manganese EDTA CAS 15375-84-5[1], solfato di magnesio CAS 10034-99-8[1].
[1]CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Il prodotto contiene: Acido borico, ferro solfato, zinco solfato. Contiene Benzoisothiazolinone, può provocare reazioni allergiche.



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H360Fd: Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in raccolta dei rifiuti o il riciclaggio, dopo un accurato risciacquo, se in conformità con le normative locali e nazionali.

**INFORMAZIONI DI PERICOLO SUPPLEMENTARI:**

Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.

**CARATTERISTICHE**

I microelementi sono fondamentali per lo sviluppo delle piante e quando si verificano carenze di uno o più di questi elementi della nutrizione (in suoli particolari, con elevati valori di pH o in condizioni di asfissia, ecc.), si possono originare seri problemi agronomici.
I microelementi infatti interagiscono con il metabolismo della pianta entrando in alcuni processi quali la fotosintesi, la respirazione e la sintesi degli aminoacidi. Infine una buona dotazione di microelementi contribuisce ad aumentare la resistenza agli stress abiotici da parte delle piante. LIXOR® MICRO fornisce alla coltura un equilibrato cocktail di microelementi che possono essere rapidamente assorbiti sia per via fogliare che per via radicale nella innovativa formulazione fluida totalmente solubile in acqua.

**PRECAUZIONI E COMPATIBILITA'**

LIXOR® MICRO è compatibile con la maggior parte, ma non con tutti, gli agrofarmaci, promotori di crescita e concimi sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda gli effetti biologici; perciò si consiglia sempre di verificare la compatibilità o l'eventuale fitotossicità causata da una miscela con un altro prodotto non testato in quanto l'eventuale incompatibilità può dipendere da fattori al di fuori del controllo di BIOGARD, quali lo stato della coltura, le condizioni climatiche, i volumi di acqua utilizzati, ecc.