

ZOXIS 250 SC

ZOXIS 250 SC è un fungicida ad attività preventiva, curativa e antisporente della classe degli analoghi delle strobilurine. Dopo l'applicazione viene in parte assorbito dalla vegetazione e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie con movimento translaminare.

COMPOSIZIONE Azoxistrobin pura g 22,8 (250 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione Concentrata

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg per anguria, cetriolino, cetriolo, melone, zucca, zucchino, melanzana, peperone, pomodoro, fragola; 7 gg per carota, fagiolino, aglio, cipolla, scalogno, carciofo; 14 gg per cavoletti di bruxelles, fagiolo, pisello, pisello proteico; 15 gg per porro; 28 gg per riso; 35 gg per grano, orzo, tritiale. Su asparago trattare dopo la raccolta dei turioni.

N° DI REGISTRAZIONE 16314 del 16.01.2017

CONFEZIONE L 1 - 5

INDICAZIONI DI ATTENZIONE PERICOLO H317 - H332 - H410 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
 Anguria, Cetriolino, Cetriolo, Melone, Zucca, Zucchino (tutte in pieno campo e in serra)	Peronospora, Didimella, Oidio	0,8	Effettuare al massimo 2 trattamenti almeno ogni 5 giorni.
 Melanzana, Peperone, Pomodoro (tutte in pieno campo e in serra)	Peronospora, Cladosporiosi, Alternaria	0,8	Effettuare al massimo 2 trattamenti almeno ogni 7 giorni.
 Aglio, Cipolla, Porro, Scalogno	Peronospora, Alternaria, Ruggini	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti almeno ogni 7 giorni.
 Carciofo	Peronospora	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti almeno ogni 7 giorni.
 Fumento, Triticale, Orzo	Ruggini, Rincosporiosi, Oidio, Elmintosporiosi, Septoria	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti minimo ogni 10 giorni tra la fase di 2° nodo e la fioritura.
 Riso	Brusone, Elmintosporiosi	1	Applicare su risaia allagata con circa 10 cm di acqua. Effettuare al massimo 2 trattamenti minimo ogni 10 giorni tra la fase di botticella e la spigatura.
 Carota	Alternaria	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti minimo ogni 10 giorni.
 Asparago	Ruggine, Stemfiliosi	1	Trattare dopo la raccolta dei turioni. Effettuare al massimo 2 trattamenti almeno ogni 10 giorni.
 Cavoletti di Bruxelles	Alternaria, Micosferella	1	Massimo 2 trattamenti a distanza di 10 giorni.
 Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Pisello proteico	Antracnosi, Muffa Grigia, Oidio, Ruggini		
 Fragola	Oidio	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti almeno ogni 7 giorni.

- Ampio spettro d'azione
- Fungicida ad attività preventiva
- Selettivo per api, bombi ed artropodi utili