

syngenta

Primo Maxx II

Riduce la crescita della parte epigea delle graminacee ma non dell'apparato radicale: erba più forte e meno biomassa

Caratteristiche

Composizione	Trinexapac etile puro g 11,30 (116,4 g/l) + Coformulanti q.b. a g 100
Registrazione n°	16473 del 22/07/2020
Formulazione	Liquida
Marchio registrato	Syngenta
Imballo	Bottiglia da 1l

Descrizione

Primo Maxx II agisce sull'allungamento delle cellule inibendo la sintesi delle gibberelline, quindi riducendo la crescita di foglie e internodi. Il prodotto rallenta la crescita della porzione epigea delle graminacee, ma non dell'apparato radicale che può essere favorito sia in termini di sviluppo in profondità, sia in termini di accumulo di sostanze di riserva. Il principio attivo penetra nella pianta attraverso le foglie e gli steli e migra rapidamente, verso i punti di accestimento delle graminacee. Primo Maxx®: prodotto e marchio registrati Syngenta Crop Protection S.p.A. - Italia

Vantaggi

- Migliora la colorazione, l'aspetto e la densità del tappeto erboso
- Aiuta a ridurre la biomassa prodotta fino al 50%
- Migliora densità e sviluppo radicale

Modalità d'uso

È appositamente studiato per la coltivazione e manutenzione di tappeti erbosi di graminacee sottoposti a utilizzo intenso. Specifico per campi da golf (aree di partenza o tees, aree di percorso o fairways, aree circostanti i percorsi o rough/semi-rough, green) e similari (campi sportivi, ippodromi, tappeti erbosi ricreativi ed ornamentali). Tempo di penetrazione: circa un'ora Dopo il trattamento, l'irrigazione o piogge improvvise non ne pregiudicano l'efficacia. Utilizzabile sia prima sia dopo lo sfalcio. Efficace su tutte le specie di graminacee che entrano nella composizione dei tappeti: Agrostis spp.,

ICL

Festuca spp., Poa spp., e Lolium spp., Cynodon dactylon. Il prodotto non ha effetto sulle specie dicotiledoni.

Dosaggi

Destinazione d'uso	Dose l/ha	Numero applicazioni	Altezza taglio tappeto erboso	Intervallo tra applicazioni (settimane)
Greens e similari	0,4	6-10	<7	2-4
Aree di pertinenza (tees, fairways, ecc)	0,8-0,16	8-9	8-18	4-5
Aree circostanti (rough/semirough)	1,6-2,4	4-5	>18	5-8
Aree circostanti a prevalenza di Lolium spp.	3,2	4-5	>18	5-8

Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.