Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

U 46® D FLUID

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

COMPOSIZIONE

2,4 D sale dimetilamminico
59,9 % (= 720 g/l)
pari a 49,8 % (= 600 g/l)
di 2,4 D acido

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 00133 del 23-07-1971	SL Liquido (concentrato) solubile in acqua	Non miscelabile con fungicidi e insetticidi.	720	1 L	 PERICOLO H318, H410, EUH401

BUFFER ZONE	GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
5 metri da vegetazione naturale	O	3082	9	Nufarm	Nufarm

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Frumento, Orzo, Avena, Segale	Centocchio *(Anagallis arvensis)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Farinaccio *(Chenopodium album)*, Stoppione *(Cirsium arvense)*, Vilucchio *(Convolvulus arvensis)*, Erba calenzuola *(Euphorbia heliscopia)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Piantaggine comune *(Plantago lanceolata)*, Ranuncolo *(Ranunculus arvensis)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Acetosa minore *(Rumex acetosella)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Crespino *(Sonchus arvensis)*, Soffione *(Taraxacum officinale)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Ortica minore *(Urtica urens)*, Veccia *(Vicia angustifolia)*, Veccia *(Vicia sativa)*	0,6 - 1,2 l/ha	Dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili. Volume d'irrorazione: 200-600 l/ha	60 gg	1

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - U 46 D Fluid è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.
U 46 D Fluid non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U 46 D Fluid devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni