259 x 128 mm

MASSÓ
AGRO DEPARTMENT

MINERVE

DISERBANTE SELETTIVO

GRANULI SOLUBILI

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono:
DICAMBA PURO g 70, COFORMULANTI q.b. a 100
MECCANISMO D'AZIONE: GRUPPO HRAC O - Erbicida

Registrazione n. 16232 Ministero della Salute del 12/01/2015

FLACONE	TAPPO
HDPE 2	HDPE 2
SIGILLO BOCCA FLACONE	
C/ALU 84	

CONTENUTO NETTO: 400 g

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DICOTILEDONI NEL MAIS

® Marchio registrato di Albaugh LLC o una sua sua affiliata

Partita N.: Vedi corpo della confezione

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 09/06/2023



MINERVE — DISERBANTE SELETTIVO

GRANULI SOLUBILI
COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono:
DICAMBA PURO g 70, COFORMULANTI q.b. a 100
GRUPPO HRAC O - Erbicida

CONTENUTO NETTO: 400 g

Registrazione n. 16232 Ministero della Salute del 12/01/2015

ALBAUGH TKI d.o.o.
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia, Tel.: +386 2 60 90 211 - www.albaugh.eu
Informazioni Tecniche: 800 986 776
Informazioni di emergenza CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana)

Stabilimento di produzione: **Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd.**, Jiangsu (Cina)

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.,**
Succursale ITALIA: Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Tel: +39 02 0996 8107 - E-mail: info.italia@cqmasso.com



ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non rientrare nelle zone trattate prima che le piante siano completamente asciutte. Utilizzare una fascia di rispetto di 5 m dai margini dell'area trattata in caso di applicazioni non ugelli convenzionali.

INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia:** Sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: MINERVE è un diserbante selettivo di post-emergenza, che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. E' rapidamente assorbito da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida.

Infestanti sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*).

Mediamente sensibili: Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO MAIS: Applicare il prodotto in post-emergenza, con erbe già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm. **Dose d'impiego:** 0,4 - 0,5 kg/ha. Impiegare le dosi indicate con volumi di 200-400 l/ha di acqua. **Effettuare 1 solo trattamento per stagione.**

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di Intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non impiegare su linee pure di mais e su mais dolce. Non applicare dopo che la coltura ha raggiunto un'altezza di 40 cm

MASSÓ
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)
Tel. 93 495 25 00- E-mail: masso@cqmasso.com

MM-07/23

V.3.2

www.massoagro.com