Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

ZEMIX® R WG

FUNGICIDA IN GRANULI DISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

Zoxamide pura 5,88 %
Rame metallico 25 %
(sotto forma di ossicloruro)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 12202 del 18-10-2007	WG Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)	Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica).	672 1000	1 kg 10 kg	 ATTENZIONE H317, H410, EUH401

BUFFER ZONE	GRUPPO FRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	TITOLARE REGISTRAZIONE
20 metri da acque superficiali di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro - 20 metri vegetati da acque superficiali per patata.	B	3077	9	Gowan	Gowan Italia S.r.l.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Vite da tavola e da vino	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	270-300 g in 100 litri di acqua 2,7-3 kg/ha	Impiegare in trattamenti alla parte aerea. Applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e proseguire fino alla pre-fioritura. Dall'allegagione in poi il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli. Un programma specifico di interventi antiperonosporici con Zemix R WG applicato dall'allegagione in poi consente un interessante effetto collaterale contro la botrite del grappolo *(Botrytis cinerea)*. Non applicare per più di 4 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.	28 gg	4
Patata	Peronospora *(Phytophthora infestans)*	270-300 g in 100 litri di acqua 2,7-3 kg/ha	Impiegare in trattamenti alla parte aerea. Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Non applicare per più di 4 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.	7 gg	4
Pomodoro	Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternaria *(Alternaria* spp.*)*	270-300 g in 100 litri di acqua 2,7-3 kg/ha	Impiegare in trattamenti alla parte aerea. Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Non applicare per più di 4 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.	3 gg	4

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Non trattare durante la fioritura. Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione in campo. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante l'applicazione in serra. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture appena trattate. In ogni caso, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro e di 20 metri vegetati per patata da acque superficiali.

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni