V I T A F I T

ATTIVATORE DELLE COLTURE

Caratteristiche:	è un attivatore dei processi biochimici della pianta costituito dalla combinazione di AATC, precursore dell'amminoacido naturale cisteina, con altri elementi chimici di alta qualità. Rafforza i meccanismi naturali di risposta agli stress, favorendo lo sviluppo vegetativo delle piante in particolar modo nella fase di ingrossamento, favorendo una miglior resa qualitativa e quantitativa, oltre che la consistenza e le caratteristiche organolettiche dei frutti.-
Composizione:	AATC (acido N-acetil-tiazolidin-4-carbossilico) 5%
Formulazione:	Liquido

CONFEZIONI

Cartoni da 12 flaconi da kg. 1
Cartoni da 4 taniche da kg. 5 cad-

AVVERTENZE:	può essere miscelato con tutti i concimi fogliari e gli agro farmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina.-

V I T A F I T

COLTURE	DOSI	Epoche, consigli di impiego e benefici
Orticole	50-70 ml/hl	3-4 trattamenti: post-trapianto, inizio risveglio vegetativo, prime fasi della fioritura, allegazione e/o accrescimento delle parti commestibili.- Si ottiene un migliore sviluppo, allegagione e ingrossamento dei frutti
Olivo	50-80 ml/hl	2-3 trattamenti: pre-fioritura per ottenere una maggiore allegagione, a fine fioritura per ridurre la cascola e migliorare l'ingrossamento della drupa, a invaiatura per incrementare la resa dell'olio
Frutticole	50 ml/hl	3-4 trattamenti ogni 15gg.: in fioritura e dalla caduta dei petali, per poter incrementare numero e pezzatura dei frutti oltre che l'allungamento
Agrumi	50 ml/hl	3 trattamenti: inizio fioritura, fine fioritura, frutticino allegato
Vite	50 ml/hl	3-4 trattamenti ogni 15-20gg. da inizio a fine fioritura a inizio invaiatura.- Per il miglioramento della conformazione del grappolo, e dell'allegagione, oltre che a colorazione e grado zuccherino.-
Zucchino, cetriolo, melone anguria	50-60 ml/hl	4-5 trattamenti ogni 10-12gg. da primi frutti allegati, per un miglioramento del diametro dei frutti e dell'allungamento.-
Pomodoro, peperone melanzana	50-60 ml/hl	4-5 trattamenti ogni 10-12gg. dalla fioritura dei primi fiori, all'allegagione dei primi frutti per ottenere un incremento del numero dei frutti, allungamento e ingrossamento, precocità e uniformità di maturazione.-
Carciofo	50 ml/hl	2-3 trattamenti ogni 10-12gg. a partire dalla differenziazione dei primi capolini per poter anticipare e ingrossare i capolini.-
Fragola	50 ml/hl	Sono consigliati più trattamenti ogni 15gg. durante tutto il ciclo vegetativo.-
Carota	50-70ml/hl	3-4 trattamenti ogni 10-12gg. da inizio accrescimento fittone per l'intera durata dell'accrescimento, per migliorare l'accrescimento del fittone.-
Patata	50-80 ml/hl	2-3 trattamenti da quando la pianta ha raggiunto almeno i 20 cm. e in pre-fioritura all'inizio della formazione di tuberi dopo c.ca 20gg..- Ottimale contro gli sbalzi termici e per l'ingrossamento.-
Spinacio, lattuga, rucola	1lt/ha	2 trattamenti, il primo con piantine di 5-6 foglie. Il secondo ed il terzo dopo 10-15gg.
Fagiolo Fagiolino	50-60 ml/hl	4-5 trattamenti intervallati di 10-15 gg. ad iniziare dallo stadio di 5-6 foglie
Frumento duro e tenero, orzo	0,5-1lt/ha	1-2 trattamenti dall'accestimento/levata – botticella spigatura, oppure unico trattamento a inizio spigatura.-
Mais	750 ml/ha	Nella fase compresa tra la 4° e la 7° foglia, oppure 0,5-1 lt/ha in miscela con i diserbanti di post-emergenza
Riso	400-500 ml/ha	Nel trattamento del diserbo contro le piperacee
Floricole, Ornamentali	50-60 ml/hl	3-4 trattamenti distanziati di 15-20gg., iniziando nella fase post-trapianto.-