

Informazioni per il medico

Sintomi (nell'animale da esperimento): depressione del SNC, bradicardia e dispnea

Terapia: Sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

Hergon L è un fitoregolatore appositamente studiato per prevenire od arrestare il distacco anticipato (cascola) di mele, pere e pesche.

Modalità d'impiego

Le dosi d'impiego devono essere modificate in funzione della temperatura, utilizzando concentrazioni più basse per piante irrorate in una stagione con temperature più miti; ed una concentrazione più elevata per piante irrorate in una stagione con temperature più fredde.

Hergon L con temperature inferiori a 10 °C non è in grado di svolgere la sua attività antiscaccolante.

I dosaggi di seguito riportati si riferiscono ad una temperatura media di 20 °C. Per ogni aumento di 5 °C occorre aumentare la dose dello 0,01%

• MELE

- Mele precocissime:
irrorare 7 giorni prima del raccolto alla dose dello 0,015 %, cioè 15 ml / hl
- Mele precoci:
irrorare 10 - 18 giorni prima del raccolto alla dose da 0,025 a 0,030 %, cioè 25 - 30 ml/hl
- Mele normali:
irrorare 10 - 20 giorni prima del raccolto alla dose da 0,030 a 0,050 %, cioè 30 - 50 ml/hl
- Mele tardive:
irrorare 12 - 20 giorni prima del raccolto alla dose da 0,050 a 0,075 %, cioè 50 - 75 ml/hl

utilizzando 15 ettolitri d'acqua per ettaro.

Hergon L

Fitoregolatore antiscaccola Liquido

Partita n.:*

Composizione:

NAA (acido α - naftalenacetico) puro..... g 7,5 (= 84 g/l)
Coformulanti q.b. a..... g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

P310 – Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amm.va Via Guelfa, 5 Bologna, Tel. 051 0394022

Officine di Produzione:

Biolchim S.p.A. - Medicina (BO)
Nufarm S.A.S. – Gaillon (Francia)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE)
CIFO S.p.A. – San Giorgio di Piano (BO)

Distribuito da:

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Biolchim S.p.A. - Medicina (BO)

Registrazione n. 10435 Ministero della Sanità del 12/04/2000

Contenuto netto: ml 200-250-500-750; Litri 1-5-10



• PERE

irrorare 10 - 14 giorni prima del raccolto alla dose dello 0,050 %, cioè 50 ml / hl utilizzando 15 ettolitri d'acqua per ettaro.

Per alcune varietà di mele e pere, quali quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti, rispettando la carenza di 7 giorni.

Irrorare con attrezzature munite di ugelli con imboccatura sottile, procurando di bagnare entrambe le pagine delle foglie, ma in modo di non produrre gocciolamenti.

Trattare almeno cinque ore prima di una eventuale precipitazione atmosferica.

• PESCO

effettuare il primo trattamento circa 15 - 20 giorni e il secondo trattamento 7 giorni prima della raccolta alla dose di 45 - 70 ml / hl, utilizzando 20 ettolitri d'acqua per ettaro.

Compatibilità: il prodotto di impiego da solo

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.