

Gibrelex Pastiglie
FITORMONE IN COMPRESSE SOLUBILI

Composizione:

Acido Gibberellico puro g 10

Coadiuvanti q.b. a g 100

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P401 – Conservare in luogo adatto nel rispetto delle normative vigenti. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A Milano,

Sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna Tel. 051 0394022

Registrazione n. 6223 Ministero della Salute del 31/01/1985

Officine di produzione:

PHYTOORGAN S.A.- 6 Perivias str. 14564 – N. Kifissia, Athens - Grecia

AMERILAB TECHNOLOGIES, New Hope, MN USA

CONTENUTO NETTO: g 100 (10 pastiglie da 10 g cadauna)
(20 pastiglie da 5 g cadauna)

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche:

Gibrelex Pastiglie esplica la sua attività stimolando e accelerando il metabolismo e la riproduzione cellulare dei tessuti vegetali ed i suoi effetti si manifestano su tutti gli organi della pianta, in relazione allo stato di sviluppo della stessa; dalla germinazione dei semi alla maturazione dei frutti, ed in maniera diversa per ciascuna specie.

Modalità d'impiego:

- **PERO** 10-15 g/hl usando 1000 litri d'acqua/ettaro
 - **Per stimolare l'allegagione delle varietà di difficile impollinazione.** Si deve intervenire con il 20-30 % dei fiori aperti con l'aggiunta di 100 g/hl di Bagnante adesivo: 10 g/hl usando 1000 litri d'acqua/ettaro.
 - **Per favorire l'allegagione di:** William, Coscia, Buona Luisa d'Avranches, Spadona, Spadoncina, Passacrassana, Butirra Giffard, Gentilona, Madernassa e Tionfo di Vienna. Intervenire nel pieno della fioritura, rispettando il dosaggio per non favorire la produzione di frutti deformati o la riduzione nella produzione dell'anno successivo. 15-25 g/hl usando 1500 litri d'acqua/ettaro.
 - **Per limitare i danni da gelo in fioritura.**
Intervenendo entro le 48 ore dall'inizio della gelata. Aggiungere g 100/hl di Bagnante adesivo.
- **CARCIOFO** 5-10 g/hl usando circa 500 litri d'acqua/ettaro.
 - **Per concentrare e anticipare la produzione sulle varietà:** Carciofo di Nola, Carciofo di ogni mese, Violetto di Provenza, Spinoso sardo. Intervenire con un primo trattamento al momento della formazione del primo capolino quindi con un secondo, alla dose minima, dopo la prima raccolta. Per colture non forzate i due trattamenti vanno distanziati di circa 20 giorni uno dall'altro, con il primo due mesi prima della raccolta del cimaro. Aggiungere 100 g/hl di Bagnante adesivo.
- **FRAGOLA** 5-10 g/hl, usando 600-800 litri d'acqua/ettaro.
 - **Per incrementare la produzione delle varietà:** Surprise des Halles, Red Gauntlet, Cambridge, Gorella, Aliso, Pocahontas, Favourite; intervenire 30-40 giorni prima della fioritura con l'aggiunta di 100 g/hl di Bagnante adesivo.
- **VITE** 10-15 g/hl in 1000 litri d'acqua/ettaro
 - **Per favorire l'allegagione delle uve da tavola:** Regina, Cardinal, Chasselas, Moscato d'Amburgo e altri, Pizzutello e Italia: intervenendo con il 20-30 % di fiori aperti e con l'aggiunta di 100 g/hl di Bagnante adesivo
- **ARANCIO** 10-15 g/hl usando 1500 litri d'acqua/ettaro
 - **Per migliorare la qualità e il colore della buccia** intervenendo dopo l'invasatura.
- **LIMONE** 10-15 g/hl usando 1500 litri d'acqua/ettaro
 - **Per ritardare la maturazione** intervenendo prima dell'invasatura.
- **PATATA** 5-10 g/hl

- **Per interrompere la quiescenza** e stimolare lo sviluppo dei germogli. Immergere per 10 minuti i tuberi in una soluzione alla dose indicata; la dose minima per i tuberi tagliati e la massima per i tuberi interi.
- **COLTURE FLOREALI** 10-20 g/hl usando 300-500 litri d'acqua/ettaro
 - **Per aumentare e anticipare la fioritura; per la formazione dei fiori più grossi con gambi allungati.** Intervenire ogni 30 giorni a partire dalla comparsa del primo bocciolo. Risultati positivi si ottengono su: Ortensie, Crisantemi, Ciclamini, Anemoni, Fiordalisi, Cactus.

Condizioni generali d'impiego:

Il prodotto va impiegato in assenza di vento e almeno otto ore prima dell'inizio di una eventuale pioggia. Affinché le colture trattate rispondano in pieno alle sollecitazioni del prodotto, sarà necessario che siano effettuate tutte le pratiche colturali, le concimazioni, gli interventi antiparassitari e che il terreno sia sufficientemente umido.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con tutti i più comuni antiparassitari, purché la reazione della soluzione non superi il valore di pH 7.

Avvertenza: In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per le cultivar di pero Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola, vite, carciofo, patata e fiori non citate nel testo dell'etichetta, effettuare prove preliminari su piccola superficie.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CONTENUTO NETTO: g 100 (10 pastiglie da 10 g cadauna)
(20 pastiglie da 5 g cadauna)

Gibrelex Pastiglie

FITORMONE IN COMPRESSE SOLUBILI

Composizione:

Acido Gibberellico puro g 10

Coadiuvanti q.b. a.....g 100

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P401 – Conservare in luogo adatto nel rispetto delle normative vigenti. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A Milano,

Sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna Tel. 051 0394022

Registrazione n. 6223 Ministero della Salute del 31/01/1985

Officine di produzione:

PHYTORGAN S.A.- 6 Perivias str. 14564 – N. Kifissia, Athens - Grecia

Amerilab Technologies, New Hope, MN USA

CONTENUTO NETTO: g 100 (10 pastiglie da 10 g cadauna)
(20 pastiglie da 5 g cadauna)