

NovaTec® 21 Gran



Concimi granulari e stabilizzati

Fertilizzante granulare azotato con tecnologia NET ad elevato contenuto di zolfo

- Riduce significativamente le perdite di azoto per dilavamento e volatilizzazione
- Disponibilità continua e duratura dell'azoto indipendentemente dalle condizioni atmosferiche
- Aumenta l'efficienza dell'azoto distribuito
- Elevato apporto di zolfo
- Attività acidificante nel suolo: aumento dell'assorbimento di fosforo e microelementi
- Ideale per le colture estensive, orticole e frutticole

Descrizione

NovaTec® 21 Gran è un fertilizzante granulare con tecnologia NET, a base di 3,4 DMPP

(Dimetilpirazolo-fosfato), che, legata all'azoto ammoniacale, consente un aumento dell'efficienza dell'azoto poiché ne rallenta il processo di nitrificazione.

Questo consente di ridurre in modo considerevole le perdite dell'azoto per dilavamento e volatilizzazione, aumentando la disponibilità per la coltura della forma ammoniacale con notevoli benefici produttivi; la pianta

spende infatti meno energia per l'assorbimento dell'azoto ammoniacale, rendendola disponibile per altri processi metabolici. La tecnologia NET aiuta inoltre a ridurre il pH nella zona radicale aumentando l'assorbimento di fosforo, ferro e manganese.

Dichiarazione

Urea-solfato ammonico N (+SO₃) 21 (+60) con inibitore della nitrificazione (DMPP)

Contenuto	Nutrienti	
21,0 %	N	azoto totale
		21,0 % azoto ammoniacale
60,0 %	SO ₃	anidride solforica solubile in acqua
0,8 %	DMPP	(3,4-dimetilpirazolofofosfato) in relazione all'azoto ammoniacale

Raccomandazioni per l'applicazione

Uva da vino

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Uva da tavola

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Pomacee

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Drupacee

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Kiwi

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Olivo

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

In primavera

Frutta a guscio

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Agrumi

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

Ripresa vegetativa

Orticole

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose orticole in pieno campo (q/ha):

2 - 6

Momento dell'applicazione

1 - 2 applicazioni ciclo

Dose orticole in serra (q/ha):

2 - 6

2 - 4 applicazioni ciclo

Patata

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 4

Momento dell'applicazione

In copertura

Pomodoro

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 4

Momento dell'applicazione

In copertura

Barbabietola da zucchero

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 4

Momento dell'applicazione

In copertura

Mais

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 4

Momento dell'applicazione

In copertura

Girasole

Applicazione prevista

Applicazione al terreno

Frequenza di applicazione

1 - 2 / anno

Tasso di applicazione

Dose (q/ha):

2 - 4

Momento dell'applicazione

In copertura

Ulteriori raccomandazioni per l'applicazione

- **Sorgo** --> Dose (q/ha): 2 - 4; Epoca di applicazione: In copertura
- **Tabacco** --> Dose (q/ha): 2 - 4; Epoca di applicazione: In copertura

Per la colture indicate si considera l'applicazione al terreno e 1-2 appl./anno.

Forma di consegna

- sacchi da 25 kg
- big bag da 600 kg

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Trasporto

- Consegna in sacchi su pallet.
- Proteggere il prodotto dall'umidità durante il trasporto.
- Proteggere il prodotto da luce diretta e elevate fluttuazioni di temperatura durante il trasporto.
- Trasportare il prodotto solo a temperature moderate.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Conservazione generale

- Proteggere il prodotto immagazzinato dal gelo, dalla luce e dall'umidità.
- Conservare il prodotto al chiuso.
- Non impilare più di due pallet uno sull'altro. Conservare solo nell'imballaggio originale.
- Il prodotto, se nella confezione originale, può essere conservato fino a 3 anni.
- I prodotti dovrebbero essere consumati il più rapidamente possibile una volta aperti.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza.