

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI: [PFC 1(C)(II)(b)] CONCIME MINERALE A BASE DI MICROELEMENTI IN SOLUZIONE

TITOLO DICHIARATO:

4,0 % p/p Boro (B) etanolamina, idrosolubile
0,02 % p/p Molibdeno (Mo) sodio, idrosolubile
4,5 % p/p Zinco (Zn) citrato, idrosolubile

Altre indicazioni:

4,0% p/p Azoto (N) totale

ELENCO DEGLI INGREDIENTI:

Etanolamina di boro¹ (CAS: 68425-67-2), citrato di zinco¹ (CAS: 546-46-3).

¹Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

ISTRUZIONI D'USO:

SugarMover Zn è un concime liquido che fornisce boro, molibdeno e zinco, i principali nutrienti necessari nel processo di riempimento di cereali e bulbi. Il boro presente in **SugarMover Zn** è un elemento essenziale che migliora il trasporto degli zuccheri dalle foglie (*source*) ai frutti/tuberi/cariossidi (*sink*). Molibdeno e zinco sono nutrienti che favoriscono la fotosintesi e la sintesi proteica che migliorano le caratteristiche di qualità, calibro e uniformità. Grazie alla **Stoller Formulation Technology**, forniamo una nutrizione adeguata che interviene naturalmente nei processi fisiologici delle piante.

DOSI E MODALITÀ D'USO							
Coltura						Momento di applicazione	
Culture arabili	Grano, orzo, segale, triticale, avena, sorgo, mais, girasole	✓	0,65 %	300-500	2-3	Dal riempimento del seme alla maturità (BBCH 71-89)	1-2 applicazioni ogni 15-30 giorni
Ortaggi da frutto		✓	0,40 %	700-1000	5-10 3	Inizio del cambio di colore. 30 e 15 giorni prima della raccolta	1-2 applicazioni ogni 7-15 giorni
Coltivazioni industriali	Cotone	✓	0,70 %	700-1000	5	BBCH 52-61-83 (Prima apparizione di bottoni fiorali, inizio della fioritura, 30 % capsule di cotone aperte)	1-3 applicazioni ogni 15-30 giorni
Oleaginose e legumi	Soia, colza, pisello, fagiolo	✓	0,30 %	700-1000	2-3	Dalla comparsa dei baccelli alla maturità (BBCH 71-89)	1-2 applicazioni ogni 15-30 giorni
Pascoli, alfalfa		✓	0,65 %	300-500	2-3	10 giorni prima del taglio	1 applicazione
Da tubero		✓				Dal riempimento del tubero alla maturità (BBCH 71-89)	
Bulbi		✓	0,30 %	700-1000	2-3	Dal riempimento del bulbo alla maturità (BBCH 71-89)	1-2 applicazioni ogni 15-20 giorni
Ortaggi da radice		✓				Dal riempimento delle radici alla maturità (BBCH 71-89)	
Frutteti	Frutta a nocciolo, frutta da seme	✓	0,50 %	1000-1500			
	Tropicale, avocado, kaki	✓					
Agumi		✓	0,25 %	2000-2500	5	30 e 15 giorni prima della raccolta	1-2 applicazioni ogni 7-15 giorni
Oliveto		✓					
Vite	Uva da tavola	✓	1,00 %	500-700			
	Uva da vino	✓					
Frutti rossi		✓	0,40 %	700-1000	3	5-10 30 e 15 giorni prima della raccolta	2-4 applicazioni ogni 7-15 giorni 1-2 applicazioni ogni 7-15 giorni
	Applicazione fogliare		Fertirrigazione		Concia del seme		Trattamento alla semina
	Dosi minime		Dosi min - mass (L/ha)		Volume trattamento (L)		Vol. tratt. (L) min - mass
	Frequenza						

Contattare l'azienda Stoller Europe o il distributore Stoller Europe dell'azienda o un tecnico specializzato, per raccomandazioni più specifiche.

Osservazione:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti liquidi. Tuttavia, se si vuole miscelare con altri prodotti, è necessario consultare il tuo distributore o rappresentante locale. Sarà responsabilità dell'utilizzatore aumentarli o diminuirli in base alle caratteristiche della coltura, sempre con la consulenza di un Tecnico specializzato. Si consiglia sempre di fare una piccola prova prima di usare il prodotto.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO RACCOMANDATE:

Immagazzinare i recipienti tra 0 e 35 °C. Condizioni generali per lo stoccaggio: evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica in contatto con alimenti. Attenersi anche alle informazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza dei materiali (MSDS).

INFORMAZIONI SU SICUREZZA E AMBIENTE:

Leggere attentamente le istruzioni sull'etichetta prima di utilizzare il prodotto. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante. La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).



ATTENZIONE

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

Indicazioni di pericolo: H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H319: Provoca grave irritazione oculare. **Consigli di prudenza:** P264: Lavare accuratamente dopo l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi protezione gli occhi/calzature protettive. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori.

UFI: T960-UOPR-900N-3VOQ

Centro Antiveleno: (+39) 038 22 44 44

ALTRE INFORMAZIONI/INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Uso professionale.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

Fertilizzante certificato per agricoltura biologica in conformità alla R(EU) 2018/848.

0,15 % p/p Rame (Cu) idrosolubile

Avvertenze:

Stoller Europe S.L.U. dà tutte le indicazioni in base all'esperienza. Possono presentarsi molti fattori incontrollabili (preparazione della miscela, clima, tipi di applicazione, ecc.). Per questa ragione, l'utilizzatore sarà responsabile per ogni danno che possa derivarne.

Prodotto da:
STOLLER EUROPE, S.L.U.
A Stoller Group Company

Elche Parque Empresarial
C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (Spagna)
(+34) 965 110 522
info@stollereurope.com
www.stollereurope.com



FORMA FISICA: Liquido in soluzione
PESO NETTO: 6,6 kg e
VOLUME NETTO: 5 L e
NUMERO DI LOTTO:

Flacone	HDPE2
Tappo	PP

