CONSPICUO®

Fungicida in Granuli Idrodispersibili (WG)

Codici FRAC: 7 (Boscalid), 11 (Pyraclostrobin)

CONSPICUO®

Autorizzazione del Ministero della salute N. 18560 del 5/12/2024

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Boscalid puro	g	26,7
Piraclostrobin puro	g	6,7
Coformulanti q. b. a	g	100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,
30th floor, Hanyu Financial Centre, Building A5-5,
No. 7000 East Jingshi Road, Jinan, 250101 Cina

Rappresentata in Italia da:
Rainbow Agrosciences Co., Ltd.,
Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Co. Dublino, Irlanda
Tel. +34 973737377

Stabilimenti di produzione:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd., Shandong, Cina
Qingdao Rainbow Chemical Co., Ltd., Qingdao, Shandong, Cina
Ningxia Rainbow Chemical Co., Ltd., Ningxia, Cina
Exclusivas Sarabia S.A.U, Lleida, Spagna

Distribuito da
RAINBOW AGROSCIENCES S.A. Fraga (Huesca) Spagna Tel. +34 973 737377

Contenuto: 0,5-1-2,5-5 L

Partita n. vedi timbro

® Marchio registrato del gruppo RAINBOW

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Nel caso in cui sia necessario rientrare dopo un breve periodo dall'applicazione, indossare indumenti protettivi e guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili utilizzare guanti, tuta e maschera filtrante tipo FFP2

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica e di supporto.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

CONSPICUO® è un fungicida indicato per la lotta contro: le moniliosi di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio; la cladosporiosi (nerume) del susino; la cladosporiosi del pomodoro; l'oidio di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carota, colture ornamentali e floreali; la botrite di bietole da foglia e da costa, fragola, broccoli, pomodoro, melanzana, peperone, lattughe e insalate, scarola, spinacio, piccoli frutti (piante arbustive e a bacche), colture ornamentali e floreali ed erbe aromatiche; la sclerotinia di lattughe e insalate, scarola, erbe aromatiche; l'antracnosi di fragola; l'alternariosi di broccoli, cavolfiore, carota; la stemfiliosi dell'asparago; la ruggine di asparago, cipolla, aglio, scalogno; il marciume bianco di cipolla, aglio e scalogno.

MODO D'AZIONE

Boscalid e piraclostrobin appartengono a due gruppi chimici distinti, le carbossianilidi e le strobilurine rispettivamente, e posseggono un diverso meccanismo d'azione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile solo in pieno campo su pesco, susino, nettarina, ciliegio, albicocco, carota, piccoli frutti, broccoli, cavolfiore, aglio, cipolla, scalogno, asparago, scarola; sia in pieno campo sia in serra su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, erbe aromatiche e lattughe e insalate (eccetto scarola), spinacio e bietola da foglia e da costa, colture ornamentali e floreali.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro. CONSPICUO® deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare CONSPICUO® o altri prodotti contenenti boscalid o pyraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell'arco dell'anno su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio), pomodoro, peperone, melanzana asparago, cavolfiore e broccoli e colture ornamentali e floreali (in serra); non più di 2 volte nell'arco dell'anno su fragola, lattughe e insalate (eccetto scarola), carota, cipolla, aglio, scalogno, spinacio, bietole da costa e da foglia, erbe aromatiche e piccoli frutti e colture ornamentali e floreali (in pieno campo); non più di 1 volta nell'arco dell'anno su scarola. È consigliabile alternare CONSPICUO® con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Coltura	Malattia	Dose g/hl	Dose Kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max. trattamenti all'anno
Pesco, nettarina, albicocco e ciliegio	Moniliosi e oidio	60-75	0,60-0,75	7-14	3
Susino	Moniliosi, oidio e cladosporiosi	60-75	0,60-0,75	7-14	3
Nocciolo	Necrosi grigia	100	1	10-15	2
Fragola (in campo e serra)	Botrite, oidio ed antracnosi	150-180	1,5-1,8	7-10	2
Frutti di piante arbustive	Botrite	150	1,5	7-10	2
Altra piccola frutta a bacche	Botrite	150	1,5	7-10	2
Pomodoro (in campo e serra)	Botrite, oidio e cladosporiosi	100 - 150	1-1,5	7-10	3
Melanzana (in campo e serra)	Botrite ed oidio	150	1,5	7-10	3

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2024

Peperone (in campo e serra)	Botrite ed oidio	100 - 150	1-1,5	7-10	3
Scarola (in pieno campo)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	-	1
Lattughe e insalate (in campo e serra)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7-10	2
Valerianella in campo e serra (raccolta dopo lo stadio fenologico di 8° foglia)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7-10	2
Spinacio (in campo e serra)	Muffa grigia	150	1,5	7-10	2
Bietole da foglia e da costa (in campo e serra)	Muffa grigia	150	1,5	7-10	2
Erbe aromatiche (in campo e serra)	Botrite, sclerotinia	150	1,5	7-10	2
Broccoli	Alternariosi e muffa grigia	100	1	7-10	3
Cavolfiore	Alternariosi	100	1	7-10	3
Asparago	Stemfiliosi e ruggine	100 - 150	1-1,5	10-15	3
Carota	Alternariosi ed oidio	100	1	7	2
Cipolla, aglio, scalogno (foglie)	Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde	150	1,5	7	2
Colture ornamentali e floreali (in serra)	Botrite e oidio	100 -150	1-1,5	7-10	3
Colture ornamentali e floreali (in pieno campo)	Botrite e oidio	100 -150	1-1,5	10	2

FITOTOSSICITÀ: CONSPICUO®, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà delle colture sopra elencate. Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

COMPATIBILITÀ: CONSPICUO® è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare; riempire il serbatoio con acqua fino a metà; mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria; continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione; dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo.

Sospendere i trattamenti: 120 giorni prima della raccolta per asparago; 28 giorni prima della raccolta su nocciolo; 21 giorni prima della raccolta su scarola, 14 giorni prima della raccolta su lattughe e insalate (eccetto scarola), spinaci, bietole da foglia e da costa, broccoli, cavolfiore, carota, cipolla, aglio, scalogno, ed erbe aromatiche; 3 giorni prima della raccolta su pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, frutti di piante arbustive ed altra piccola frutta a bacche.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2024