



TAN[®] FRUIT BLANC

FORMULATO RIDUCENTE
A BASE DI TANNINI D'UVA E DI TÈ VERDE

COMPOSIZIONE



Tannini catechinici (estratti da uva e da tè verde) 10%, Acido L-ascorbico (E300) 40%, Potassio metabisolfito (E224) 50%.

Contiene solfiti.

CARATTERISTICHE



Formulato policomposto studiato per ottenere una completa azione di copertura nei confronti dell'azione dell'ossigeno sui mosti. La contemporanea presenza di pregiati tannini catechinici e di principi attivi antiossidanti (l'acido L-ascorbico e il metabisolfito di potassio) consente al TAN[®] FRUIT BLANC di agire sul potenziale ossidoriduttivo (rH) del mosto; è possibile così mantenere le caratteristiche aromatiche originarie e di trasferirle prodotto finale, per l'ottenimento di vini freschi e fruttati, ma varietali.

I tannini selezionati per la formulazione di TAN[®] FRUIT BLANC sono di origine procianidinica e catechinica e sono caratterizzati da un'elevata reattività sia nei confronti delle proteine, comprese le polifenolossidasi. Si tratta di tannini di alta gamma, estremamente fini dal punto di vista organolettico, estratti rispettivamente dalla buccia d'uva e da foglie di tè verde.

IMPIEGHI



Trova impiego fin dalle prime fasi di elaborazione, al momento dell'ammostamento. Ben omogeneizzato nella massa TAN[®] FRUIT BLANC sfrutta l'effetto sinergico dell'anidride solforosa, dell'acido L-ascorbico e dei tannini catechinici per precludere le attività ossidative di degradazione. Questa azione è supportata dalla natura dei tannini scelti, noti per la loro azione antiossidasica ed in grado di limitare l'azione degli enzimi naturalmente presenti nelle uve.

Nei mosti provenienti da uve bottrizzate TAN[®] FRUIT BLANC dà il suo contributo nella prevenzione dei processi ossidativi indotti dalla laccasi.

TAN[®] FRUIT BLANC conferisce al prodotto maggior durata nel tempo e resistenza alle ossidazioni, permettendo la presenza di una maggior aliquota di solforosa libera. I vini così elaborati risultano aromaticamente più complessi, fruttati e dotati di corpo di maggior spessore.

Per l'impiego del TAN[®] FRUIT BLANC attenersi alle norme di legge vigenti in materia.



TAN® FRUIT BLANC

FORMULATO RIDUCENTE
A BASE DI TANNINI D'UVA E DI TÈ VERDE



MODALITÀ D'USO

Sciogliere accuratamente la quantità necessaria di TAN® FRUIT BLANC in 10 parti di acqua e quindi aggiungere alla massa; non usare oggetti metallici ed acqua ricca in calcare.
È consigliato l'utilizzo fin dall'ammestamento.



DOSI

Da 15 a 20 g/hL alla pigiatura o nei mosti appena ottenuti.
Attenzione: 20 g/hL di TAN® FRUIT BLANC apportano 80 mg/L di acido L-ascorbico e 50 mg/L circa di anidride solforosa.



CONFEZIONI

Sacchetti in poliacoppiato da 1 kg.



CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.



PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere scheda di sicurezza).