MERCATO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Erbicida selettivo per carota, pisello, pomodoro, mais, patata, girasole, sorgo, tabacco.

Meccanismo d'azione: HRAC/WSSA 32 – Codice HRAC: S

MERCATO

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

Aclonifen puro	g 50.73% (600 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene: 2-cloro-3-fenossi-6-nitro-anilina.



UFI: 1PMM-Y3A7-0K2C-S309

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene aclonifen, 1,2 benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523
Officine di produzione: UPL Europe Ltd. – Hall Lane, Rookery Bridge Sandbach, Cheshire, CW11 3QQ (Regno Unito). Arysta LifeScience Ougrée Production sprl – Ougrée (Belgio).
Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara; ARCO Logistica Srl - Via Monari 5, 44124 Ferrara.

Registrazione del Ministero della Salute n. 18226 del 29/02/2024

Contenuto netto: 1-5-10 litri **Partita n° ……..**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti e guanti adatti. Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulla superficie fogliare siano completamente asciugati.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di:
-10 metri per carota, pomodoro, pisello, girasole, sorgo, tabacco
- 20 metri o in alternativa 10 metri con l'utilizzo di ugelli che riducano la deriva del 50% per, patata.
- 5 metri per mais. Non applicare in aree con pendenza superiore al 4 % in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Erbicida impiegabile in trattamenti di pieno campo in pre-emergenza e in post emergenza precoce. In pre-emergenza il prodotto è assorbito dale infestanti in fase di germinazione attraverso l'ipocotile e i cotiledoni. In post emergenza precoce il prodotto è assorbito dai cotiledoni e dalle prime foglie delle piante in germinazione. Il prodotto è attivo prevalentemente su infestanti dicotiledoni.
INFESTANTI SENSIBILI :
Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus)*, Anagallide rossa (*Anagallis arvensis*), Camomilla bastarda *(Anthemis arvensis),* Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris),* Farinello comune *(Chenopodium album),* Lappolina (*Coronopus didymus*), Erba sofia (*Descurainia sophia*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), Attaccamani (*Galium aparine*), Erba Ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla),* Papavero (*Papaver rhoeas),* Persicaria *(Polygonum persicaria),* Erba Calderina *(Senecio vulgaris),* Senape *(Sinapis arvensis),* Centocchio *(Stellaria Media),* Crespino dei campi *(Sonchus arvensis),* Crespino liscio *(Sonchus oleraceus),* Veronica ederifoglia *(Veronica hederaefolia).*
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Polygonum convolvulus*)

MODALITA 'D'IMPIEGO

DOSI D'IMPIEGO ED EPOCA DI IMPIEGO

Carota	2,5-3 L/ha	Pre emergenza (subito dopo la semina)
Pisello	2,5-3 L/ha	Pre emergenza
Patata	2,5-3 L/ha	Pre emergenza (dopo semina oppure dopo la rincalzatura)
Pomodoro, tabacco	2,5-3 L/ha	Pre trapianto
Girasole	2,5-3 L/ha	In Pre-emergenza subito dopo la semina della coltura
Mais	1,5-2,0 L/ha	In Pre emergenza (subito dopo la semina)
Sorgo	1,0-1,5 L/ha	In Pre emergenza (subito dopo la semina)

Su mais e sorgo impiegare la dose più bassa su terreni leggeri. In post emergenza precoce impiegare la dose più bassa in presenza di infestanti allo stadio cotiledonare.

Volume d'irrorazione: 300-500 L/ha

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

- Nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d'acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza.
- Su carota utilizzare la dose inferiore prevista, qualora le temperature superino i 30 °C.
- Impiegare il prodotto in condizioni di assenza di vento
- Non impiegare sui mais da seme, mais dolce e da "pop-corn".
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata è possibile la risemina o il trapianto della coltura stessa, previa lavorazione superficiale a 8 cm.
- L'uso ripetuto di erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione può determinare la comparsa di erbe infestanti resistenti. Allo scopo di evitare o ritardarne la comparsa occorre attenersi alla dose e alle raccomandazioni riportate in etichetta ed è inoltre consigliabile alternare formulate dotati di differenti meccanismi d'azione. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti con il prodotto. Ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

FITOTOSSICITÁ

Nelle colture per le quali è autorizzato l'impiego del prodotto solo in pre-emergenza, non intervenire dopo l'inizio dell'emergenza.

ATTENZIONE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 febbraio 2024 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 9 luglio 2024

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.