

PANTERA TOP

Diserbante graminicida sistemico e selettivo post-emergenza

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo1 (A) HRAC/WSSA

Concentrato Emulsionabile (EC)

PANTERA TOP

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Quizalofop-P-etile puro g 5,26 (= 50 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

UFI : UAPE-X4C3-ASKU-XWCR

Indicazioni di pericolo

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie - H315 Provoca irritazione cutanea - H318 Provoca gravi lesioni oculari - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini - H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti.

Registrazione Ministero della Salute n. 18445 del 01/09/2023

Titolare dell'Autorizzazione

ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.

BP 80, route d'Artix, 64150 Noguères - Tel. (+33) 05 59 60 92 92

Officine di Produzione

Arysta LifeScience S.A.S.- Route d'Artix - 64150 NOGUERES (Francia)

Arysta LifeScience Ougrée Production sprl - Rue de Renory 26 - 4102 Ougrée (Belgio)

Distribuito da:

UPL Italia S.r.l., via Terni, 275 Cesena, 47522 -Tel 39 0547 661523

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10 – 20

Partita N.....del.....



PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di inalazione, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Non indurre il vomito.

In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Durante le operazioni di miscelazione e caricamento è obbligatorio indossare guanti protettivi, indumenti da lavoro e protezioni per viso/occhi.

Indossare guanti protettivi e indumenti da lavoro se in contatto con superfici contaminate.

Durante l'applicazione del prodotto è obbligatorio indossare guanti protettivi e indumenti da lavoro, oppure è possibile indossare soltanto indumenti da lavoro se l'applicazione viene effettuata con trattore cabinato.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Nel caso in cui il lavoratore entri nell'area trattata, dovranno essere indossati pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe. Si consiglia l'uso di guanti protettivi.

Per proteggere i residenti, utilizzare ugelli che riducano la deriva almeno del 50% durante l'applicazione e, per impieghi su ceci, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri e utilizzare ugelli che riducano la deriva almeno del 50%.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali di 5 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 50% per usi a 3 L/ha.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali di 5 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 30% per usi a 2.5 L/ha. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata o applicare una riduzione totale della deriva secondo quanto indicato in tabella:

Dose (l/ha)	Fascia di rispetto non trattata (senza riduzione della deriva)	Riduzione totale della deriva (se fascia non trattata = 0 metri)
1,0 - 1,2 - 1,4	5 m	50%
1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5	5 m	75%
3,0	5 m	90%

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare immediatamente un medico o un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:

PANTERA TOP è un erbicida selettivo e sistemico per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni su numerose colture: colza, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio, soia, girasole, cotone, fagiolo e pisello (consumo fresco e secco), fagiolino, fava, favino, tabacco, trifoglio, erba medica, veccia, patata, lenticchia, cece, cipolla, aglio, scalogno, carota, ravanella, rapa, cavoli, cavolfiori, broccoli, pomodoro, melanzana, agrumi, pomacee, drupacee, nespolo, nespolo del Giappone, frutta a guscio, semi di lino/ lino, piante ornamentali, forestali e vivai.

COLTURE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Pantera Top è attivo contro:

- graminacee annuali, incluse: coda di topo (*Alopecurus* spp.), loietto (*Lolium* spp.), giavone (*Echinochloa* spp.), pabbio (*Setaria* spp.), sanguinella (*Digitaria* spp.), avena (*Avena* spp.), scagliola (*Phalaris* spp.), fienarola (*Poa annua*);
- graminacee perennanti, incluse: agropiro comune (*Agropyron repens*), gramigna comune (*Cynodon dactylon*), sorghetta (*Sorghum halepensis*).

Effettuare una sola applicazione all'anno, utilizzando il prodotto contro infestanti in attiva crescita: impiegare la dose minore dalla 1° alla 3° foglia vera e la dose massima all'accestimento

COLTURA	STADIO COLTURA	DOSE L/ha
CAVOLI A INFIORESCENZA (cavoli broccoli, cavolfiore) e CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles, cavolo verza), altri cavoli	A partire dalla 2° foglia distesa	1-3
POMODORO MELANZANA	A partire dalla 2° foglia distesa	1-3
COLZA (invernale e primaverile)	Prima della chiusura della fila	1-3
TABACCO	Fino al termine dell'allungamento degli internodi	1-3
PATATA	Prima della chiusura della fila	1-3
ERBA MEDICA TRIFOGLIO VECCIA	Prima della chiusura della fila	1-3
POMACEE (melo, pero, cotogno)	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specificata	1-3
DRUPACEE (pesco, nettarino)	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specificata	1-3
NESPOLO NESPOLO DEL GIAPPONE	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specificata	1-3
AGRUMI	Trattare in assenza di frutti	1-3
FRUTTA A GUSCIO	Trattare in assenza di frutti	1-3
ORNAMENTALI VIVAI FORESTALI	Utilizzare solo con attrezzature schermate	1-3
LINO COTONE	Fino al raggiungimento della dimensione finale delle capsule	1-3
SOIA GIRASOLE	Fino a fine fioritura	1-2.5
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIETOLA ROSSA BARBABIETOLA DA FORAGGIO	A partire dalla 2° foglia vera	1-2.5
AGLIO CIPOLLA SCALOGNO	Fino al 30% della dimensione finale del bulbo	1-2.5
CAROTA RAVANELLO RAPA	Dalla 1° foglia vera a prima della raccolta	1-2.5
FAGIOLINI FAGIOLI PISELLI	Dalle 2 foglie vere fino al termine dell'allungamento degli internodi	1-2.5

FAVA FAVINO		
CECI LENTICCHIA (secchi e semi secchi) FAGIOLO (secchi e semi secchi) PISELLI (secchi e semi secchi)	Dalle 2 foglie vere fino al termine dell'allungamento degli internodi	1-2.5

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Riempire il serbatoio fino a circa metà della capacità massima. Aggiungere PANTERA TOP, mescolando, quindi aggiungere il volume d'acqua necessario.

COMPATIBILITÀ:

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Attenzione:

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE:

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'alternanza d'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

FITOTOSSICITÀ:

Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

- 100 giorni prima della raccolta per colza
- 60 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio, soia, girasole
- 45 giorni prima della raccolta per lino e cotone
- 42 giorni prima della raccolta per fagiolo e pisello (consumo fresco), fagiolino, fava e favino
- 40 giorni prima della raccolta per tabacco
- 30 giorni per fagiolo e pisello (consumo secco), patata, lenticchia, cece, aglio cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanella, cavoli a testa, cavoli a infiorescenza, pomodoro, melanzana, pomacee, pesco, nettarino, nespolo, nespolo del Giappone

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con i mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso- Operare in assenza di vento - Da non vendersi sfuso - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato